

QK
388
C61

42-82-

ILLUSTRATIONES FLORÆ ATLANTICÆ

SEU

ICONES PLANTARUM NOVARUM, RARIORUM VEL MINUS COGNITARUM

IN ALGERIA NECNON IN REGNO TUNETANO ET IMPERIO MAROCCANO NASCENTIUM

AUCTORE

E. COSSON

ACADEMIE SCIENTIARUM PARISIENSIS SODALI, AUCTORE COMPENDII FLORÆ ATLANTICÆ, ETC.

FASCICULUS VI

TABULÆ 124-148 A CLL. CH. CUISIN ET A. RIOCROUX AD NATURAM DELINEATÆ

HUIC LIBRO IN LUCEM PROFERENDO

PRÆPOSITUS APUD FRANCO-GALLOS INSTITUENDÆ JUVENTUTI

HONORIS CAUSA, PUBLICAM STIPEM CONTULIT



PARISIIS
E REIPUBLICÆ TYPOGRAPHEO
SIGILLORUM CUSTODIS PERMISSU

NOVEMBRI M DCCC XCIII

1893

MASSON ET C^{IE}
400 fr.
PRIX DE VENTE
OBLIGATOIRE

PARISIIS

VENIT APUD G. MASSON

VIA DICTA BOULEVARD SAINT-GERMAIN, N° 120



134714

TABULA 124.

LUDOVICIA Coss.

Ludovicia Coss. ap. Bourg. *Pl. Alg. exs.* [1856], et in *Bull. Soc. bot.* III, 674. — *Hammatolobium* Benth. et Hook. *Gen. I.*, 509 ex parte.

« *Calyx tubuloso-campanulatus*, 5-dentatus, *subbilabiatus* nempe dentibus superioribus paulo latioribus subascendentibus. Petala unguibus liberis calyce paulo brevioribus; vexillum amplum, limbo ovato-suborbiculato subcomplacito, in unguem constrictum; alæ vexillo breviores, carina latiores, oblongo-obovatae, in unguem elongatum abrupte constrictæ, supra unguem plica obliqua carinæ marginem gibbosum excipientes; *carina* navicularis, compressa, *alis paulo brevior*, dorso arcuata, apice acutiusculo mucronulata. Stamina 10, submonadelpha, filamento vexillari superne vix cæteris adhærente vel libero, filamenta in parte superiore libera tenuissime membranacea dilatato-subspathulata. Stylus elongatus, filiformis, a basi geniculato-ascendens; stigma subdilatato-compressum, imberbe. *Legumen late lineare*, *calyx multoties longius*, rectum, a lateribus *compresso-complanatum*, ad semina torulosum, marginibus paululum incrassatis submarginalatum, *pluriarticulatum*, demum in articula secedens, articulis monospermis, indehiscentibus, contiguis, venulis obsoletis, apice acutato-rostratum. Semina suborbiculata, ad hilum subemarginata, compressa, lævia, estrophiolata. »

« Suffrutex in Algeria occidentali regno Maroccano confini indigena, habitu *Lotos* e sectione *Bonjeania* referens, *foliis trifoliolatis*, *stipulis* liberis foliaceis *homomorphis*, floribus aureis demum subfuscescens, 1-3 apice pedunculorum in axilla foliorum superiorum umbellatis, umbella folio bracteali trifoliolata suffulta. » (Coss. in *Bull. Soc. bot.*)

Obs. Novum genus nostrum fundatur planta quam cl. et dilectus mecum collaborans Durieu de Maisonneuve, dum Burdigalensem pagum cursu peragerem, augusto mense 1854 ultiro mihi obtulit, in ipso tempore quo Ludovicus Durieu, ejus filius major natu, leviter equidem ægrotans, morte tamen improvisa fuit raptatus: juvenis ille variis dotibus jam præclarus apud omnes Parisienses botanicos patre familiariter utentes, et in futurum clarior evasurus. In illius dilecti juvenis memoriam cognomen *Ludovicia* plantæ impertivi. Sit de tam properato exitu mei memoris perenne pignus. — Genus *Ludovicia* habitu *Lotos* e sectione *Bonjeania* refert, sed legumine articulato tribus *Hedysareæ* (DC. *Prodr. II*, 307) ad subtribum *Coronilleæ* (DC. *l. c.* 308) pertinet, ubi juxta genus *Ornithopus* collocandum, a quo differt notis plurimis, præsertim foliis trifoliolatis, non imparipinnatis, carina alis paulo breviore, seminibus suborbiculatis, non oblongo-linearibus, etc. — Ad genus *Hammatolobium* Fenzl (*Pug. pl. nov. Syr. et Taur. 3*; Endl. *Gen. Suppl. III*, 103. — Exs. Bal. *As. min. 475*) propius accedit, sed differt calyce tubuloso-campanulato, subbilabiato, non campanulato dentibus æquilongis, et præsertim legumine compresso-complanato articulis contiguis marginibus paululum incrassatis submarginatis, non legumine compresso articulis inflatis inter semina constricto. (Coss. gall. *ling. I. c.*)

LUDOVICIA KREMERIANA Coss.

L. Kremeriana Coss. ap. Bourg. *Pl. Alg. exs.* [1856], et in *Bull. Soc. bot.* III, 675. — *Hammatolobium Ludovicia* Batt. et Trab. *Fl. Alg. 288*. — Exs. Bourg. *Alg. 149*, Coss. in Puel et Maille 1.

Planta perennis, a basi ramosa, multicaulis, 2-6 decim. alta, radice lignosa verticali inferne sensim attenuata plus minus ramosa. Caules annotini 15-40 centim. longi, erecti, ascendentes

vel diffusi, graciles, saepe flexuosi, teretes, in longitudine tota foliati, simplices vel superne ramos axillares emittentes, rufescentes, pilis longiusculis simplicibus patentibus villoso-subhispidi, parte inferiore tantum indurato-lignosa hieme persistente. Folia subsessilia, trifoliolata foliolis subsessilibus, oblongis vel oblongo-lanceolatis, acutis, integerrimis, internodiis saepius aequilongis, facie utraque adpresse sericeo-villosis pilis longis rufescensibus extra margines disfluentibus. Stipulae foliaceæ, foliolis aequilongæ et homomorphæ, foliolas inferiores omnino simulantibus. Rami axillares erecto-patentes, plus minus elongati, apice 3-foliolati et saepius florigeri. Flores majusculi, 18-20 millim. longi, lutei, subsessiles, apice caulum ramorumque lateralium 2-3 congesti, rarius solitarii. Calyx pilis longis rufescensibus adpressis subsericeus, tenuiter membranaceus, persistens, dentibus triangulari-acuminatis, tubo brevioribus, superioribus præsertim inferne latioribus. Petala glabra, calycem excedentia. Legumen lineare, compresso-complanatum, usque 6 centim. longum, 4 millim. latum, rectum vel leviter incurvum, pilis brevibus adpressis sericeum, articulis quadratis marginibus exterioribus incrassatis faciebus membranaceis convexiusculis. 2. Mart.-Maio.

In rupium fissuris et anfractibus regionis Mediterraneæ provinciae Oranensis occidentalis. — Med. O¹ : Nemours (Krém., Bourg., Warn., War., Oliv., etc.).

In Algeria hucusque tantum nota.

EXPLICATIO FIGURARUM.

1. *Ludovicia Kremeriana*, planta florifera et fructifera, caulis pluribus resectis, magn. nat.
 2. Caulis fragmentum, magn. auctum.
 3. Folium 3-foliolatum cum stipulis foliaceis homomorphis, magn. auctum.
 4. Flos a latere visus, magn. auctus.
 5. Calyx a latere visus, magn. auctus.
 6. Vexillum explanatum, a facie interiore visum, magn. auctum.
 7. Ala a facie interiore visa, magn. aucta.
 8. Carina a latere exteriore visa, magn. aucta.
 9. Stamina submonadelpha, magn. aucta.
 10. Stamen magn. magis auctum.
 11. Styli pars superior ad stigma ostendendum, magn. ampliore aucta.
 12. Leguminis pars superior, magn. aucta.
 13. Semen magn. magis auctum.
-

TABULA 125.

HEDYSARUM NAUDINIANUM COSS. ET DR.

H. Naudinianum Coss. et DR. ap. Bourg. *Pl. Alg. exs.* [1856]; Coss. in *Bull. Soc. bot.* III, 675; Batt. et Trab. *Fl. Alg.* 293.
— *H. papale* Pomel *Nouv. mat.* 199. — Exs. Kral. in Bourg. *Alg.* 211 a, Deb. in Choul. 226 et in Bill. 2054.

« *Planta* speciosa, perennis, plus minus pubescenti-sericea, altitudine 30-40 centim., *caudice* frutescente multicipite. *Caules* longiusculi pedunculos axillares 1-3 emittentes et saepius per anthesim supra ultimum pedunculum gemma terminali jamjam evoluta plus minus producti. *Folia*

longe petiolata, 4-8-juga, foliolis oblongis vel ovato-oblongis, mucronulatis, facie superiore punctis impressis innumeris conspersa glabrescente vel parce pubescente, facie inferiore pubescenti-sericea, caulina plura vel pauca. Stipulae membranaceo-scariosæ demum fuscescentes in unicum oppositifoliam bifidam coalitæ. *Pedunculi* caule longiores, 15-25 centim. longi, pluriflori. Flores majusculi, 15-20 millim. longi, in racemum oblongum longissime pedunculatum dispositi, primum erecti dein patuli, pedicellis calycis tubum subæquantibus, sub calyce bibracteolatis. *Calyx* sericeo-villosus, *dentibus* acuminato-subulatis, *tubo* longioribus, superioribus distantibus. *Corolla* lilacino-purpurascens, marcescens sed *fructu* maturo sæpius decidua, *vexillo* obovato-oblongo emarginato *carina* breviore, alis oblongis carina duplo brevioribus, carina latere inferiore rectiusculo abrupte in angulum rectum arcuato. *Legumen* longitudine corollam sæpius superans, 2-3-articulatum, interdum abortu ad articulum unicum reductum, *articulis* suborbiculatis, diametro 9-13 millim., rarius oblongo-suborbiculatis, valde compressis, medio tantum convexis, *aculeis* biseriatis simplicibus bifidisve inæqualibus plus minus prominentibus et *basi confluentibus* quasi marginatis, reticulato-venosis, aculeis destitutis, *pubescentia* brevi adpressa subcanescensibus. »
(Coss. in Bull. Soc. bot.) 2. Fl. Febr.-Maio. Fr. Jun.-Jul.

In collibus et pascuis montosis, in dumetosis et sylvaticis regionis Montanæ mediæ et inferioris, præsertim in sylvis Pini Halepensis. — **Mont.** C¹: inter *Oued Sahel* et *Guelaa Beni Abbès*, in fauces *Biban* (Lx). — A³: in sylva *Kseffa* prope *Aumale* (Char.), *Teniet Mouzaïa* (Dur.), *Adelia* (Batt.), *Dj. Taskrouna* prope *Medeah* (Lx), inter *Medeah* et *Boghar* ad *Aïn-Moudjerar!* (Kral.), in sylva *Boghar!* (Krém., Lx), *Belle-Fontaine* prope *Boghar* et in sylvaticis versus *Teniet-el-Haad* (Deb.), inter *Boghar* et *Dalia* (Naud.), ad orientem *Bokhari* (Lx).

In Algeria hueusque tantum notum.

Obs. Cl. Naudin Musei naturalis historiæ adjutori quam prope *Boghar* detexit ille, qui primus inter botanicos illam regionem accurate exploravit, hanc speciem dedicatam voluimus. — *H. Naudinianum* leguminibus reticulato-venosis, pubescentia brevi adpressa subcanescensibus ad sectionem *Echinolobium* (DC. Prodr. II, 340) pertinet, in qua juxta *H. humile* L. et *H. Perrauderianum* collocandum, sed a speciebus duabus præsertim differt legumine articulis multo latioribus, marginibus aculeis biseriatis basi confluentibus quasi marginatis præditis. (Coss. gall. t. c.) — In « *Enumeratio monographica specierum generis Hedysari* » a cl. Basiner elaborata *H. Naudinianum* stipulis in unicum oppositifoliam bifidam coalitis ad sectionem *Gamotion* (Basin. l. c. 5; Boiss. Or. II, 512) pertinet, in qua caulinis longiusculis, stipulis parvis, leguminis articulis reticulato-venosis, vexillo carina breviore juxta *H. humile* subsectionis II collocandum.

EXPLICATIO FIGURARUM.

1. *Hedysarum Naudinianum*, pars florifer et fructifer e caudice excerpta, magn. nat.
2. Caulis fragmentum ad stipulas coalitas ostendendum, magn. auctum.
3. Foliolum a facie inferiore visum, magn. auctum.
4. Flos a latere visus, magn. auctus.
5. Calyx a latere visus, magn. magis auctus.
6. Vexillum a facie interiore visum, magn. auctum.
7. Ala a latere interiore visa, magn. aucta.
8. Carina a latere exteriore visa, magn. aucta.
9. Stamina diadelpha, magn. aucta.
10. Ovarium longitrorsum sectum, magn. auctum.
11. Styli pars superior ad stigma ostendendum, magn. ampliore aucta.
12. Leguminis pars superior, magn. aucta.

TABULA 126.

HEDYSARUM PERRAUDERIANUM COSS. ET DR.

H. Perrauderianum Coss. et DR. ap. Bal. *Pl. Alg. exs.* [1853], et in *Bull. Soc. bot.* III, 739; Batt. et Trab. *Fl. Alg.* 293. — Exs. Perr. in Bal. *Alg.* 1020, Hén. et Lefr. in Choul. 128.

« *Planta speciosa, perennis*, pube adpressa *sericeo-canescens*, altitudine 30-50 centim., *caudice frutescente*, saepius multicipite. *Caulis abbreviatus* pedunculos axillares 1-3 emittentes et per anthesim supra ultimum pedunculum gemma terminali non evoluta vel abortiva saepius haud producti. *Folia longe petiolata*, 4-8-juga, foliolis oblongis, ovato-oblongis vel suborbiculatis, mucronatis mucronulatisve, facie superiore punctis impressis innumeris conspersa, caulinis pauca. *Stipulae membranaceo-subscariosae* in unicum oppositifoliam bifidam coalitæ. *Pedunculi* caule longiores, 20-40 centim. longi, *pluri-vel multiflori*. *Flores maximi*, 20-25 millim. longi, in racemum oblongum longissime pedunculatum dispositi, primum erecti, dein patuli; pedicellis calycis tubum subæquantibus, sub calyce bibracteolatis. *Calyx sericeo-villosus*, *dentibus acuminato-subulatis*, superioribus distantibus, inferioribus saltem *tubo longioribus*. *Corolla lilacino-purpurascens*, marcescens persistens, *vexillo* obovato-oblongo subemarginato *carina breviore*, alis oblongis carina duplo brevioribus, carinæ latere inferiore rectiusculo abrupte in angulum rectum arcuato. *Lignum* longitudine corollam subæquans vel paulo superans, 2-4-articulatum, *articulis* oblongo-suborbiculatis, compressis, medio convexis, *immarginatis*, *reticulato-venosis*, *aculeis* destitutis, *pubescentia* brevi adpressa canescentibus. » (Coss. et DR. in *Bull. Soc. bot.*) 27. Jun.-Jul.

In dumetosis et sylvaticis montosis, in pascuis et convallis argilloso-calcareis regionis Montanæ provinciae Cirtensis. — **Mont. C²: Dj. Tougour!** (Col., Perr., Bal., Hén. et Lefr.), *Batna* (Col.), *Dj. Itche-Ali* (Bal., Lefr., Lx), *Lambèse* (Bal., Duk., Lx), *Sgag* (Lx); in sylvaticis prope *Aras* (Reb. et Oliv.).

Algeriæ peculiare.

Obs. Pulcherrimam hanc plantam cl. H. de la Perraudière quam prope *Batna* detexit dedicavimus. Hic per se in Algeria mihi comitem se dedit et in investigationibus libenter feliciterque nos adjuvit. — *H. Perrauderianum* leguminibus reticulato-venosis, pubescentia brevi adpressa canescentibus ad sectionem *Echinolobium* (DC. *Prodr.* II, 340) pertinet, in qua juxta *H. humile* collocandum, sed praesertim differt habitu robustiore, caulis brevioribus, foliolis majusculis, floribus subtriplo longioribus, corolla fructus per maturitatem persistente. Notæ ex aculeis in faciebus leguminis deficientibus excerptæ non differentias specificas multoque minus sectionis discrimina constituunt, nempe in *H. humile* e speciminibus Algeriensibus leguminum articuli nunc aculeis donati nunc destituti. — *H. Tauricum* (Pall.; DC.) e specimine leguminibus destituto a cl. Steven ad J. Gay misso ut quoque e descriptionibus *H. humile* legumine aculeis destituto haud distinctum videtur. (Coss. gall. illus. t. c.)

EXPLICATIO FIGURARUM.

1. *Hedysarum Perrauderianum*, ramus florifer e caudice excerptus, magn. nat.
2. Caulis pars superior jam fructifer, magn. nat.
3. Caulis fragmentum ad stipulas coalitas ostendendum, magn. auctum.
4. Foliolum a facie inferiore visum, magn. auctum.

5. Calyx a latere visus, magn. auctus.
 6. Vexillum a facie interiore visum, magn. auctum.
 7. Ala a latere interiore visa, magn. aucta.
 8. Carina a latere exteriore visa, magn. aucta.
 9. Stamina diadelpha, magn. aucta.
 10. Ovarium longitrorsum sectum, magn. auctum.
 11. Styli pars superior ad stigma ostendendum, magn. aucta.
 12. Legumen maturum, magn. nat.
 13. Leguminis pars superior, magn. aucta.
-

TABULA 127.

HEDYSARUM MEMBRANACEUM COSS. ET BAL.

H. membranaceum Coss. et Bal. in Bal. *Pl. Mar. exs.* [1867]; Coss. in *Bull. Soc. bot.* XX [1873], 246; Ball *Spic. Marocc.* in *Linn. Soc. Journ.* XVI [1878], 435.

« *Planta* plus minus pubescentia sericea, *perennis* inferne *fruticosa*, 1 vel 1 1/2 metr. alta, ramosa, laxe dumosa, ramis erectis saepius confertis indurato-rigidis striato-angulatis. *Folia* petiolata, imparipinnata, 4-7-juga, foliolis minutis, supra glabrescentibus infra pubescentia subsericeis, oblongis, petiolulatis, margine arefactione saepius subinvolutis, obtusis mucronulatis vel subretusis. *Stipulae* membranaceo-scariosae, fuscæ, cito evanidæ, *inter se basi et cum petiolo adnatæ*. *Racemi* axillares, 3-4-flori, laxi, folio saepius breviores, floribus circiter 15 millim. longis, primum erectis dein patulis, pedicellis calycis tubo brevioribus sub calyce minute bibracteolatis bracteolis linearibus fuscis. *Calyx* pubescentia subsericeus, tubo campanulato, *dentibus* e basi triangulari linearibus *tubo subtriplo brevioribus*, superioribus distantibus. *Corolla* glabra, pallide *lilacino-purpurascens*, marcescens sed fructu maturo decidua, *vexillo* oblongo-obovato *carina* vix *breviore*, alis oblongis carina triente brevioribus, *carina* latere inferiore sensim arcuata. Stamen vexillare liberum, cætera in vaginam membranaceam superne fissam coalita in quarta parte superiora libera filiformia. *Legumen* 2-4 centim. longum, apertissime et minutissime puberulum, stipitatum stipite calyce longiore, 2-3-articulatum saepè abortu ad articulum unicum redactum, inter articulos angustius, articulis 9-12 millim. latis *plano-compressis*, disco oblongo reticulatum nervoso *aculeis* destituto, ad semen tantum convexiusculo, margine membranaceo latitudinem dimidiā disci excedente. Semina subreniformia, estrophiolata. » (Coss. in *Bull. Soc. bot.*) 27. Maio-Jun.

In glareosis, in alluviis et alveis, interdum etiam inter segetes imperii Marocani austro-occidentali. — MAR. *Mesfioua* Hook. et Ball, *Keïra* (Bal.), *Dj. Tourgueth* (Ibr.), *Dj. Tizelmi* et alibi in montosis ditionis *Tazeroualt* (Mard.).

Imperio Maroccano peculiare.

OBS. « *H. membranaceum* inter omnes species generis insigne stipularum fabrica, racemis brevibus laxifloris, dentibus calycis brevibus, carina sensim arcuata, leguminibus complanatis latissime membranaceo-marginatis. » (Coss. l. c.)

EXPLICATIO FIGURARUM.

1. *Hedysarum membranaceum*, ramus annotinus florifer in caule anni præteriti enatus, magn. nat.
 2. Caulis fructiferi segmentum ad legumina matura ostendendum, magn. nat.
 3. Caulis segmentum ad stipulas coalitas ostendendum, magn. auctum.
 4. Folium, rachi infra foliola infima resecto, magn. nat.
 5. Foliolum longitudinaliter plicatum, magn. auctum.
 6. Flos a latere visus, magn. auctus.
 7. Calyx a latere visus, magn. magis auctus.
 8. Vexillum a facie interiore visum, magn. magis auctum.
 9. Ala a facie interiore visa, magn. magis aucta.
 10. Carina a latere exteriore visa, magn. magis aucta.
 11. Stamina diadelpha, magn. magis aucta.
 12. Ovarium longitrorsum sectum, magn. magis auctum.
 13. Styli pars superior ad stigma ostendendum, magn. ampliore aucta.
 14. Leguminis pars superior, magn. aucta.
 15. Lomenti sectio transversa, magn. aucta.
-

TABULA 128.

ACACIA GUMMIFERA WILLD.

A. gummifera Willd. Sp. IV, 1056; Poir. Encycl. suppl. I, 64; DC. Prodr. II, 455; Hayne Arzneiger. X, t. 28; Benth. Rev. Mimos. in Trans. Linn. Soc. XXX [1874], 509; Ball Spic. Marocc. in Linn. Soc. Journ. XVI [1878], 442; Hook. in Hook. et Ball Journ. of tour Marocc. 393 excl. syn. — *Mimosa gummifer* Brouss. in litt. — Exs. Schousb. Mar. in Rel. Maill. 50 et bis.

Arbuscula glabra, dumosa, 2-2 1/2 metr. alta (sec. Ball), truncо diametro 11 centim. haud excedente, ramis erecto-patentibus, strictis, teretibus, aculeis stipularibus armatis, foliatis, vetulis atro-griseis striatis albo-punctatis interdum rimosis, novellis rubescensibus parum elongatis longitudinaliter sulcatis. *Folia alterna*, petiolata, in ramis junioribus solitaria, in cæteris fasciculata, bipinnata, pinnis 1-3-jugis, foliolis 6-10-jugis, 6-7 millim. longis, sessilibus, oblongo-linearibus, obtusis, glaucescentibus, glabris, subtus uninerviis nervo simplici, petiolo communi (rachi) exacte in angulo pinnarum per paria dispositarum glandula minima instructo. *Stipulae* lignosæ, spinescentes, saepius 10 millim. longæ, conicæ, validæ, rectæ, interdum leviter recurvatae, albidae, laeves, erecto-patentes, ima basi coalitæ, divergentes, rarius minimæ vel abortivæ. *Pedunculi axillares*, solitarii, 12-15 millim. longi, ad medium (nunc medio, nunc paulo supra nunc paulo infra medium) involucelli, bracteolis 4, brevissimis, ovato-triangularibus, lanato-subtomentosis, mox eranidis, fructiferi robusti, stipulis saepius paulo longiores, simplices, apice clavati et delapsu florum alveolato-tomentosi. *Flores numerosi*, parvi, apice pedunculorum in capitulum globosum dense congesti, sessiles, bracteati. *Bracteæ* spathulatae, margine longe ciliatae, calyce paulo breviores. *Calyx* brevis, rubescens, tubuloso-subcampanulatus, 5-nervius nervis prominulis, 5-lobatus lobis brevissimis æqualibus ovato-rotundatis lanato-tomentosis margine ciliatis. *Corolla* tubu-

losa-campanulata, calyci haud adnata, 5-dentata *dentibus* ovato-oblongis, obtusis, margine *ciliatis*, tubo subdupo brevioribus, calyci subæquilongis. Stamina indefinita, libera vel ima basi sub-coalita, hypogyna, corolla duplo æquilonga, filamentis gracilibus sub lente transverse constrictis et subannulatis. Antheræ parvulae, subglobosæ, biloculares loculis indivisis longitudinaliter dehiscentibus. Ovarium sessile, compressum, lanato-subtomentosum, in stylum glabrum unilateralem staminum filamentis æquilongum vel paulo longiore productum. Legumina apice peduncularum saepius 1-2, rarius 3, *immatura elongata, angusta, complanata*, haud torulosa, *utrinque attenuata, dense albido-tomentosa, matura recta* vel leviter arcuata, inferne attenuata, usque 17 centim. longa, 12-14 millim. lata, compressa, torulosa, inter semina saepius paulo constricta, rarius submonili-formia, intus continua, bivalves valvis ægre dehiscentibus convexiusculis tenuiter incrassatis coriaceis extus *dense breviterque albido-tomentosis* intus glaberrimis, nitidis, reticulato-venosis. Semina lignosa, ovoideo-subcompressa, nigrescentia, lævia, facie utraque lunula ellipsoidea ad hilum aperta notata. ♂. Fl. Maio. Fr. Jun.

In planiciebus incultis et in sylvis austro-occidentalibus imperii Maroccani. — MAR. Tanger cult. in hort. (Schousb.); Mogador (Brouss. sec. DC., Bal., Ibr.), Oued Fonti, Ouanina, Oued El-Guirah (Ibr.), Dj. Tamersac inter Mogador et Haha (Bal.), sat frequens in provinciis Chiadma et Haha (Hook. et Ball), Oued Sous in parte media ad meridiem Taroudant (Ibr.).

Imperio Maroccano peculiaris.

Obs. *A. gummifera* stipulis omnibus spinescentibus validis rectis, pedunculis axillaribus ad medium bracteatis, floribus glabris ad gregis *Medibracteate normales* sectionem *Gummiferæ* (Benth. l. c. 509) pertinet, in quo a speciebus Africanis platycarpiis pinnis 1-3-jugis, pedunculi involucello deciduo, leguminibus extus dense breviterque albido-tomentosis obsolete nervosis eximie distincta. — *A. coronillefolia* DC. (*Cat. hort. Monsp.* 73. — *Mimosa coronillefolia* Desf.; Pers. *Syn.* II, 263) a cel. Hook. (*Journ. of tour Marocc.* 393) ad *A. gummifera* relata foliolis subtus reticulato-venosis distincta videtur.

EXPLICATIO FIGURARUM.

1. *Acacia gummifera*, ramus florifer ramulis pluribus resectis, magn. nat.
2. Ramulus fructifer legumina immatura gerens, magn. nat.
3. Ramulus fructifer legumen magis evolutum gerens, magn. nat.
4. Pedunculus florifer floribus nondum evolutis, magn. auctus.
5. Flos magn. auctus.
6. Bractea magn. magis aucta.
7. Calyx arte fissus et explanatus, a facie exteriore visus, magn. magis auctus.
8. Corolla arte fissa et explanata, a facie exteriore visa, magn. magis aucta.
9. Staminis pars superior, a facie exteriore visa, magn. ampliore aucta.
10. Staminis pars superior, a facie interiore visa, magn. ampliore aucta.
11. Pollinis granula in massam aggregata, magn. ampliore aucta.
12. Ovarium cum stylo, magn. auctum.
13. Ovarium longitrorsum sectum ad ovula biseriata ostendendum, magn. auctum.
14. Ovulum magn. magis auctum.
15. Legumen maturum a facie visum, magn. nat.
16. Semen a facie visum, magn. auctum.
17. Embryo magn. auctus.

TABULA 129.

ACACIA TORTILIS HAYNE.

A. tortilis Hayne *Arzneigew.* X, t. 31; Nees *Pl. off.* t. 333 sec. Benth.; Schweinf. in *Linnæa* XXXV [1867], 327, t. 22; Benth. *Rev. Mimos.* in *Trans. Linn. Soc.* XXX, 506; Oliver *Fl. trop.* II, 352; Boiss. *Or.* II, 636; Coss. in *Bull. Soc. bot.* XXXIV, 121⁽¹⁾. — ?*Mimosa tortilis* Forsk. *Eg.-Arab.* 176. — *Acacia Seyal* DC. *Prodri.* II, 460 ex parte non Delile. — *A. fasciculata* Guill. et Perr. in Guill. Perr. et A. Rich. *Senegamb.* I, 252 non R. Br., nec Kth; Benth. in *Hook. Lond. Journ. bot.* I [1842], 502. — *A. Raddiana* Savi! in *Arch. bot.* I, 373 sec. Walp. *Report.* I [1842], 924. — *A. Perrottetii* Steud. *Nom. bot.* ed. 2 [1840], 7. — *A. Arabica* Bonn. in *Nouve. Archiv. Mus.* ser. 2, V, 140 non Willd. — Exs. Sieber *Eg.* (Syene) sub *A. Seyal*, Schweinf. 44 et 119, Lx *Nub.* 257.

Arbor glabra, saepius 7-8 metr. alta, 13 metr. haud excedens, saepe dumosa, trunco erecto, rimoso, circ. 1-2 metr. longo, diametro saepius 30-50 centim. rarissime ultra 1 metr. longo, in ramos validos plurimos diviso, *ramis numerosissimis rubescens* longitudinaliter striatis, aculeis stipularibus armatis, *comam latam rotundatam apice applanatam efficientibus*. *Folia alterna*, petiolata, fasciculata, rarius solitaria vel geminata, *bipinnata*, pinnis breviter petiolulatis 2-6-jugis, *foliolis* 5-12-jugis, 3-4 millim. longis, subsessilibus, *oblongo-linearibus*, *obtusis*, rarius acutiusculis, glaucescentibus, crassiusculis, glabris, approximatis imbricatis, subtus uninerviis nervo simplici, *petiolo* *communi* (rachi) *infra singula juga glandula minima instructo* et ultra supremam jugam in appendicem styliformem brevem producto. *Stipulae* geminatae, lignosae, *spinescentes*, ima basi coalitae, glaberrimae, *magnitudine valde variables*: *nunc elongatae validae rectae*, saepius 30-40 millim. rarius paulo ultra *longae*, albidæ, laeves, horizontaliter patentes, *nunc abortivæ parvulae recurvatae pallide fuscescentes cum validis saepe alternantes*. Inflorescentia coætanea. *Pedunculi axillares*, solitarii vel geminati, rarius 5-fasciculati, secus ramos floriferos laxe racemosi, glabriuscui, *ad medium bracteolati*, *bracteolis* 4 verticillatis, ima basi subcoalitis, ovato-triangularibus acutis, *glabris*, *persistib*us, fructiferi 15-25 millim. longi, bracteolis marcescentibus instructi. *Flores numerosi*, albidi, parvi, *glabri*, apice pedunculorum *in capitulum globosum dense congesti*, sessiles, bracteati. Bracteæ spathulatae vel cochleatae, margine longe ciliatae, calyci æquilonigae, post anthesim saepe persistentes. *Calyx* brevis, tubuloso-campanulatus, 5-nervius nervis subinerassatis prominulis, 5-lobatus lobis brevissimis æqualibus ovato-rotundatis crassiusculis intus concavis *margine parce ciliatis*. *Corolla* tubuloso-campanulata, calyce duplo longior, *glabra*, 5-fida laciniis ovato-oblongis acutis. *Stamina* indefinitea, libera, hypogyna, corollæ duplo æquiloniga, filamentis gracilibus sub lente vix undulato-sinuatis. *Antheræ* parvulae, subglobosæ, biloculares, loculis indivisis longitudinaliter dehiscentibus. *Ovarium* sessile, compressum, glabrum, in stylum gracilem unilateralem staminibus paulo breviorem productum. *Legumina* in apice pedunculorum 1-5, *linearis-elongata*, 5-7 millim. lata, inferne attenuata, *immatura complanata*, *haud torulosa*, glaberrima vel parce breviterque puberula, *falcata vel spiraliter contorta*, longitudinaliter nervosa *nervis parallelis* prominulis *anastomosantibus*, *matura saepius falcata*, *compressa*, *torulosa*, 10-12-sperma, inter semina plus minus *constricta*, submoniliformia, intus continua, *bivalves valvis tarde dehis-*

⁽¹⁾ De scriptis ad *Acacia tortilis* pertinentibus vide Coss. *I. c.*

centibus, *tenuibus*, *coriaceis*, *glaberrimis*. Semina lignosa, oblonga, compressa, olivaceo-viridia, laevia, nitida, facie utraque lunula angusta ellipsoidea ad hilum aperta notata. ♂. Per hiemem florens, Martio ineunte jam deflora et fructifera.

In pascuis argilloso-arenosis vel gypsaceis, in collibus petrosis apricis Tunisiæ australis ad septentrionem *Chott El-Fedjedj* præsertim inter 34° 30' et 34° lat. sept. — **TUN.** *Biar-mta-el-Arreb* prope et ad austro-occidentem *Sebkha Sidi-el-Hani* ubi limitem septentrionalem areæ attingeret (sec. Blanc); inter *Oued Leben* et *Dj. Mazouna*, ubi primum anno 1874 a cl. Doumet-Adanson lecta, *Dj. Mazouna* (Doum., Doum. et Bonn. miss. 1884), *Dj. Douara* (Thomas), *Dj. Bou-Hedma* (Doum., Doum. et Bonn. miss. 1884, Gran.), *Dj. Eddedj*, *Oued Eddedj*, in planitie *Tahla* frequens, ubi specimina numerosa plus minus approximata sylvam vere constituant, prope et ad septentrionem *El-Hafay* (Doum. et Bonn. miss. 1884), in planitie *Mahamla*, *Khanget Oum-el-Oguel* (Lx miss. 1886), *Bled Cegui* (Doum. et Bonn. miss. 1884).

In agro Tripolitano (Rohlfs sec. Aschers.); in vallis Niloticae desertis inter 31° et 14° lat. sept. ab isthmo Suez usque ad Kordofanum septentrionalem inclusa : isthmo *Suez* (sec. Aschers. et Schweinf. *Illustr. Æg.*), «*Egypti totius deserta parte tam Libya quam Arabica*» (Schweinf.), littore maris Rubri ad *Kosseir* (Schweinf.), *Assouan* [Syene] (Sieber), *Dj. Soturba* (Schweinf.), insula *Darmout* (Lx), provinciis *Sulkot*, *Dongola*, *Berber*, *Matamma* et Kordofano sept. (Schweinf.); in Arabia : monte *Sinai* (sec. Schweinf.), Arabia petræa ad *Ouadi Mokatteb* (Boiss. *Fl. Or.*), usque ad 31° lat. sept. (sec. Schweinf.), Arabia felici (sec. Schweinf.); Senegal absque loco peculiari (Heudelot sec. Oliv. *Fl. trop.*), in viciniis *Saint-Louis*, *Gandiol* (sec. Guill. et Perr.). — Sec. cl. Bonnet (in Morot *Journ. bot.* VII, jun. 1893) *A. tortilis* etiam occurrit : ad meridiem *Fezzan*; in ditione tota *Touareg*; ad septentrionem lacus *Menkhough* (Miss. Flatters); sparsim in ditionibus *Mâader*, *Tademait* usque ad *Oued Messyed* (Fourreau); pluribus locis ad meridiem *El-Goleah* (Dybowsky).

Obs. *A. tortilis* stipulis spinescentibus ad sectionem *Gummiferae* (Schweinf. I. c. 318; Benth. I. c. 499) pertinet. Floribus albidis capitatis, pedunculis medio bracteatis bracteis persistentibus, stipulis heteracanthis elongatis validis rectis cum parvulis recurvatis saepe alternantibus, leguminibus spiraliter contortis *A. spirocarpæ* Hochst. (in Schimp. *Pl. Abyss. exs.*; Rich. *Abyss.* I, 239; Schweinf. in *Linnæa* XXXV, 322, t. 4, 5 et 6; Oliv. *Fl. trop.* II, 352; Benth. *Rev. Mimos.* in *Trans. Linn. Soc.* XXX, 505. — Exs. Schimp. *Abyss.* 502, 612, 658) in Abyssinia crescenti valde affinis sed ab illa differt trunco 1-2 metr. longo simplici non a basi in ramos 2-4 validos diviso, foliolis glabris non tomentosis margine ciliatis, calycis dentibus parce non dense longeque ciliatis et præsertim leguminibus tenuiter coriaceis glabris non crassis tomentosis.

EXPLICATIO FIGURARUM.

1. *Acacia tortilis*, rami floriferi segmentum, magn. nat.
2. Rami fructiferi segmentum, magn. nat.
3. Pedunculus florifer ad medium involucellatus flores nondum expansos in capitulum globosum congestos gerens, magn. auctus.
4. Flos nondum expansus, magn. magis auctus.
5. Flos expansus cum bractea, magn. auctus.
6. Bractea magn. magis aucta.
7. Calyx arte fissus et explanatus, a facie exteriore visus, magn. magis auctus.
8. Corolla arte fissa et explanata, a facie exteriore visa, magn. magis aucta.
9. Staminis pars superior, a facie exteriore visa, magn. ampliore aucta.
10. Staminis pars superior, a facie interiore visa, magn. ampliore aucta.
11. Pollinis granula in massam aggregata, magn. valde ampliore aucta.
12. Ovarium cum stylo, magn. auctum.
13. Ovarium longitrorsum sectum ad ovula biseriata ostendendum, magn. auctum.
14. Ovulum magn. magis auctum.
15. Legumen spiraliter contortum, magn. nat.
16. Legumen falcatum, magn. nat.
17. Semen a facie visum, magn. auctum.

TABULA 130.

SEDUM TUBEROSUM COSS. ET A. LX.

S. tuberosum Coss. et A. Lx in *Bull. Soc. bot. XXII*, 9 [1875]; Pomel *Nouv. mat.* 325; Batt. et Trab. *Fl. Alg.* 326.

Planta perennis, glaberrima. *Caudex tuberosus* carnosus, ovatus vel subglobosus, undique fibras radicales emittens, superne vestigiis foliorum emarcidorum coronatus, foliorum radicalium rosulas 1-3 gerens, *caules* 1-3 vel plures *omnes florigeros* ex axillis foliorum radicalium enatos emittens. Caules 8-15 centim. longi, primum diffusi, dein ascendentis vel erecti, densiuscule foliati, sub anthesi foliorum delapsu inferne denudati et cicatricosi, superne in cymam corymbiformem 2-3-radiatam divisi. *Folia succulenta*, crassiuscula, *plana*, margine praesertim cellulis prominentibus crystallinis donata, *obtusa*, *integerrima*; radicalia rosulata, linearis-ovata vel oblongo-ovata, in petiolum saepius elongatum attenuata, ante anthesim emarcida; *caulina* sparsa, *oblongo-linearis* inferne angustiora, sessilia *infra insertionem in calcar obtusum producta*. *Flores pentameri*, pauci vel plures, subsessiles, in racemos 2-3 unilaterales 2-5-floros dispositi. Calyx glaber, sepalis ovatis acutiusculis. Petala lutea, ovato-lanceolata mucronata, calyce sub-duplo longiora. Stamina petalis numero dupla. *Squamulae hypogyna carnosæ*, minutæ, obovato-suborbiculatae. Carpella libera, ovato-lanceolata a latere compressa, in mucronem subulatum ipsorum tertiam longitudinem subæquantem attenuata, 10-12-ovulata, primum divergentia. demum divaricata. Semina (immatura tantum nota) oblongo-ovata, sub lente tenuissime et crebre granulata. — Descriptio juxta specimina exsiccata et viva culta. n (Coss. et A. Lx l. c.) — Semina matura seminibus immaturis omnino conformia. f. Mart.-Jun.

In saxosis et præruptis maritimis, in fissuris rupium humo repletis. — **Mont.** A¹: Dj. Tigrimount, in fauibus Palestro (Lx), Dj. Bou-Zegza (Dur. 16 jun. 1859, Lx). — **TUN.** Djeziret Djamour (Doum.), Cap Bon (Miss. 1888), El-Haouiria (Miss. 1883); Dj. Ichkeul, Kef En-Nesour in ditione Mogod, Dj. Antra in clivo meridionali ad Sidi-Ahmed-ben-Yasser (Miss. 1888), Kef El-Zoua in ditione Ouled Ali, Ghardimaou ad speluncam (Coss. miss. 1888), Kef El-Hanech (Lx miss. 1886).

In Algeria et Tunetia tantum notum.

OBS. n *S. tuberosum* caudice tuberoso, modo crescendi, forma foliorum a cæteris Sedis planifoliis floribus luteis gaudentibus eximie distinctum. n (Coss. et A. Lx l. c.)

EXPLICATIO FIGURARUM.

1. *Sedum tuberosum*, planta florifera, magn. nat.
2. Specimen minutum nondum floriferum, magn. nat.
3. Folium a facie exteriore visum, magn. auctum.
4. Folium a facie interiori visum, magn. auctum.
5. Folium oblique a latere visum, magn. auctum.
6. Flos expansus a facie superiore visus, magn. auctus.
7. Flos expansus a latere visus, magn. auctus.
8. Carpella immatura magn. aucta.
9. Carpella matura in stellam divergentia, magn. aucta.
10. Semen maturum magn. auctum.

TABULA 131.

SEDUM MULTICEPS Coss. ET DR.

S. multiceps Coss. et DR. ap. Kral. *Pl. Alg. exs.*, et ap. Coss. in *Bull. Soc. bot.* IX, 171 [1862]; Batt. et Trab. *Fl. Alg.* 326.
— Exs. Lx et Perr. in Kral. *Alg.* 116, Reb. in *Soc. Dauph.* 2885.

« *Caudex* crassiusculus, carnuloso-suffrutescens, valde irregulariterque *ramoso-multiceps* ramis elongatis vel abbreviatis saepius tortuosis vel flexuosis fibras radicales aliquot deorsum dependentes emittentibus, in radicem fusiformem desinens, *caules florigeros* et *caudiculos* anno sequente florituros *numerosissimos* emittens. Caules 5-15 centim. longi, glabri, basi procumbentes et saepe radicantes, superne ascendentibus vel erecti, simplices vel ad basim in ramos 1-2 vel plures divisi, superne ramulos florigeros gerentes, ante anthesim apice haud hamato-deflexi. *Folia* viridia, non nunquam rubentia, *sub lente crebre papillato-crystallina*, alterna, *sessilia*, *crassiuscula*, *tereti-complanata utraque pagina convexa*, *linearia*, *apice obtusa mutica*, *infra insertionem in calcar submembra-naceum truncatum producta*, patula, in caulis florigeris approximata caulem totum obtinentia, saepe ex axilla ramulum abbreviatum emittentia, in caudiculis et ramulis axillaribus plurifariam congesta inferiora ante anthesin emarcido-persistentia *superiora in rosulam* densam *subglobosam conferta*. *Flores* 5-7-meri, subsessiles, *in cymas subscorpioideas* 2-4 breves glabras 2-6-floras *cymam* corymbiformem generalem efficientes *dispositi*. Sepala linearia, obtusa; carnosula, planiuscula, dorso convexiuscula. Petala lutea, sepalis subduplo longiora, *oblongo-lanceolata*, *acuminato-cuspidata*, patentia. Stamina petalis numero dupla et subtrente breviora. Carpella a latere valde compressa, stylo longiusculo aristata, demum in stellam divergentia, oblongo-triangularia ventre supra basim in gibbum convexo. Semina oblonga, chalaza prominula, sub lente crebre tuberculata. » (Coss. in *Bull. Soc. bot.*) 24. Maio-Jul.

In petrosis et rupestribus, in fissuris rupium, in pascuis apricis regionis Mediterraneæ montosæ et Montanæ inferioris et mediae, a maris fere littore usque ad 1200 et 1500 metr. alt. A beato Durieu de Maisonneuve anno 1850 primum ex Algeria absque loco peculiari receptum et in hortis divulgatum. — **Med.** C²: *Bougie!*, *El-Milia!*, *Hammam Beni-Aroun!* (Perr., Reb.), *Maison-du-Caïd* (Lx), in valle *Oued El-Afran!*. — **Mont.** C³: *Dj. Gouffé!* (Perr.), *Kef Sidi-Driss*, *Dj. Sgao*, *Kef Souma*, in valle *Oued Sbikra*, *Dj. Mecid-Sidi-Aïcha* (Reb.), *Dj. Tafertas!* (Perr., Lx), *Dj. Mahrouf!* (Perr., Lx), *Beni Bou-Yousef!*, in fauibus *Oued Nekob!*, *Dj. Tababor!* (Reb.), *Dj. Babor!*, *Adghar-Amella!*; *Dj. Gouraïa!*.

In provincia Girtensi Algeriæ tantum notum.

Obs. *S. multiceps* in sectione *Seda genuina* Koch (*Syn. ed. 2*, 286) juxta *S. Boloniense* Lois. (*Not. 71.* — *S. sexangulare* DC. *Fl. fr.* IV, 394) collocandum, a quo differt foliis magis compressis, crebre papillato-crystallinis, *infra insertionem in calcar truncatum* non subacutum productis, *in rosulam subglobosam* apice caulium sterilium et ramorum lateralium approximatis, sepalis planiusculis dorso convexiusculis, etc. (Coss. gall. *ling. 1. c.*)

EXPLICATIO FIGURARUM.

1. *Sedum multiceps*, ramus florifer cum ramis sterilibus multis, magn. nat.
2. Folium a facie exteriore visum, magn. auctum.
3. Folium a facie interiore visum, magn. auctum.
4. Folium oblique a latere visum, magn. auctum.

5. Flos expansus a facie superiore visus, magn. auctus.
 6. Flos expansus a latere visus, magn. auctus.
 7. Carpella immatura, magn. aucta.
 8. Carpella matura in stellam divergentia, magn. aucta.
 9. Semen maturum, magn. ampliore auctum.
-

TABULÆ 132 ET 133.

HOHENACKERIA FISCH. ET MEY. emend.

Hohenackeria Fisch. et Mey. *Ind. II sem. hort. Petrop.* 38 [1835]; Endl. *Gen. n.* 4389; Ledeb. *Ross. II*, 240; Coss. in *Bull. Soc. bot. II*, 181 [1855], et in *Ann. sc. nat. ser. 4, V*, 137; Benth. et Hook. *Gen. I*, 886.

« Flores sessiles hermaphroditique omnes, apice caulis in receptaculum dilatato et in dichotomiis aggregato-capitati, involuero plane destituti, paleisque nullis interstincti, capitulis sessilibus. Calycis limbus 5-dentatus, dentis unius vel et alterius abortu inæqualiter 4-3-dentatus, vel dentibus fere ad basim bifidis sub-10-dentatus, dentibus subulatis, patentibus, demum subspinoscentibus. Petala albo-virentia, subovato-oblonga cum lacinula inflexa. Staminum filamenta brevissima; antheræ connectivo in acumen crassiusculum producto apiculatae. Styli brevissimi, divergentes. Stylopodia conica, stipite columnari longiusculo vel breviusculo suffulta. Fructus glaber vel pubescens, tetragono-pyriformis vel ovatus, sua sponte vix bipartibilis, apice limbo calycino sessili vel in collum columnare contracto coronatus; mericarpia convexa vel superne gibba, ad commissuram plana, suberoso-corticata, cortice crassissimo vel crassiusculo, jugis primariis 5 æqualibus obtusis solidis crassiusculis ad apicem distinctis vel in parte superiore demum gibboso-incrassatis vix distinctis, jugis secundariis nullis, valleculis plane evittatis, commissura univittata. Carpophorum obsoletum, mericarpiis adnatum. Semen nisi ad latus interius pericarpio adnatum, 5-angulatum, angulis obtusis in mericarpiis juga penetrantibus.

« Plantæ annuæ, glaberrimæ, pumilæ, saepius conglobatae. Caulis quasi nullus, capitulo terminatus; rami 2 vel plures infra capitulum centrale, abbreviati simplices, vel longiusculi semel. bis vel ter dichotomi, in quaque dichotomia capitulum sessile gerentes, erecto-subdiffusi. Folia Bupleuri, numerosa, indivisa (phyllodia), margine serrulato-seabrida, lineari-lanceolata, trinervia nervis parallelis, inferne angustata, ima basi dilatata et capitula quasi involuerantia, inferiora et ramealia subæquilonga, ratione plantæ longiuscula ramos longe superantia, caulina opposita. Flores apice caulis et in dichotomiis sessiles aggregato-capitati, plane exinvolucrati, paleis nullis interstincti, capitulis sessilibus.

Obs. « Genus *Hohenackeria* inter Umbelliferas optimum et singularissimum, clarissimo Hohenacker floræ Caucasæ indagatori expertissimo et unionis itinerariæ Esslingensis conditori dicatum, capitulis exinvolucratis, stylopodiis stipite columnari suffultis, mericarpiis suberoso-corticatis, seminum angulis prominentibus in juga penetrantibus, prorsus habitu omnino peculiari a Saniculæ omnibus distinctissimum. »

Sect. I. ACKERIA Coss.

H. sect. Ackeria Coss. l. c.

« Galycis limbus 5-dentatus abortu sæpius inæqualiter 3-4-dentatus, in fructu infra dentes in collum columnare contractus. Stylopodia stipite columnari longiusculo suffulta. Fructus glaberrimus, tetragono-pyriformis, cortice suberoso crassissimo, jugis demum superne gibbosoincrassatis vix distinctis. »

1. HOHENACKERIA BUPLEURIFOLIA FISCH. ET MEY.

H. bupleurifolia Fisch. et Mey. *Ind. n sem. hort. Petrop.* 39 [1835]; Cesati in *Linnæa* XI, 323, t. 7, f. 1-6; Hohen. *Enum. pl. Talysch* in *Bull. Soc. nat. Mosc.* [1838], 321; Ledeb. *Ross.* II, 240; J. Gay *Eryng. hept.* in *Ann. sc. nat. ser. 3, IX*, 154; Coss. *Pl. crit.* 164, et in *Bull. Soc. bot.* II, 182, et in *Ann. sc. nat. ser. 4, V*, 138, t. 9; Boiss. *Or.* II, 834; Willk. et Lange *Prodr. Hisp.* III, 13; Batt. et Trab. *Fl. Alg.* 341. — *Valerianella exscapa* Stev. in *Mem. Soc. nat. Mosc.* III, 251; DC. *Prodr.* IV, 625. — *Fedia exscapa* Rœm. et Schult. *Syst.* I, 366. — *Fedia acaulis* Stev. in *Mem. Soc. nat. Mosc.* V, 354; M.-Bieb. *Taur.-Cauc.* III, 35. — Exs. Bal. *Alg.* 478, 882, Reb. et Kral. in Bourg. 205; Bourg. *Hisp.* 1192 a; Hohen. *Cauc.* un. it. [1838]; Bal. *As. min.* 1234.

« Planta ramis sæpius abbreviatis conglobata, rarissime longiusculis; foliis basi late vaginato-dilatatis, margine membranaceo-subscariosis, inferioribus sæpius persistentibus. ① Maio-Julio. »

In glareosis et in terra mobili, in pascuis, sæpius inter segetes, in Planitiebus excelsis, rarius in regione Montana. — **Mont.** C¹ : *Dj. Itche-Ali* (Lx), *Haidous!*. — O¹ : *Dj. Ksell!*. — **Plan.** C² : *Batna!* (Bal., Lefr., Duk., etc.), *Timegad!*, *Ksour* (sec. Par.); in valle *Oued Ksob* prope *Msila* (Reb.). — A¹ : ad moletrinam *Djelfa!*, *Djelfa!* (Reb. et Kral.), *Ksar Moudjebar* (Reb.). — O⁴ : *Saïda* (Batt.), *Sidi-Chaïb* (Lefr.); *Timetlas!* (Bal.), *Tafraoua!*, *Sfid!*, *El-Mai* (War.); *Oued El-Hadjel*, *Aïn-Sfa* (War.), *Géryville* (Segr., War.), *Oued Sbeïhi*, *Oum-el-Zelfan* (War.).

In Hispania austro-orientali, Georgia Caucasica, Asia minore.

Sect. II. KERACIA Coss.

H. sect. Keracia Coss. l. c.

« Galycis limbus dentibus fere ad basim bifidis sub-10-dentatus, in fructu sessilis. Stylopodia stipite breviusculo suffulta. Fructus pubescens, ovatus, cortice suberoso crassiusculo, jugis superne haud incrassatis ad apicem distinctis. »

2. HOHENACKERIA POLYODON Coss. ET DR.

H. polyodon Coss. et DR. ap. Bal. *Pl. Alg. exs.* [1853], et ap. Coss. in *Bull. Soc. bot.* II, 183, et in *Ann. sc. nat. ser. 4, V*, 140, t. 10; Batt. et Trab. *Fl. Alg.* 341. — Exs. Bal. *Alg.* 883, Reb. et Kral. in Bourg. 204 et in Bill. 1889, Lefr. in Choul. 431, War. 126 et in Soc. Dauph. 792.

« Planta evidentius dichotoma ramis longiusculis, rarius conglobata; foliis basi vaginato-sub-dilatatis, margine anguste membranaceo-subscariosis, inferioribus sub anthesi sæpius evanidis. ① Maio-Julio. »

In glareosis et in terra mobili, in pascuis et arboretis, sæpius inter segetes *H. bupleurifoliae* socia, in Planitiebus excelsis necnon in regione Mediterranea occidentali interiori, rarius in regione Montana. — **Med.** O¹ : *Dj. Tessala* (Lefr., War.), in valle *Oued Sarno* (Lefr.), *Mouley-Abd-el-Kader* (War.), *Sidi-bel-Abbès* (War., Batt.). — **Mont.** C¹ : *Haïdous!*. — **Plan.** C⁴ : *Atmenia* (Reb.), *Chott Mzouri!* (Perr., Lx), *Aïn-Yagout!*, *Oum-el-Asnam!*, *Batna!* (Bal., Lefr.), *Lambèse* (Lx), *Timegad!*, *Ksour!*, *Les Tamarins!*; *Dj. Ouled-Fatma* prope *Ngaous* (Lx); *Bordj-bou-Areridj* (Lx), in valle *Oued Ksob* : *Medjez* (Lx),

prope *Msila* (Reb.). — A³ : *Harmela* (Lx), in alluviis *Oued Chelif* prope *Bokhari*, *Saneg*, *Aïn-Sba*, *Bou-Ghezoul* (Deb. cat.), *Birin* (Lx), ad moletrinam *Djelfa!*, *Djelfa!* (Reb. et Kral.). *Ksar Moudjebar* (Reb.). — O³ : *El-Mai*, *El-Gor*, inter *El-Gor* et *Ras-el-Ma*, *Ras-el-Ma* (War.).

Algeriae peculiaris.

EXPLICATIO FIGURARUM TABULE 132^o.

1. *e Hohenackeria bupleurifolia*, planta magn. nat.
2. Flos per anthesim, magn. auctus.
3. Flos post anthesim, petalis delapsis, magn. auctus.
4. Petalum a facie visum, magn. valde auctum.
5. Stamen a dorso visum, magn. valde auctum.
6. Floris diagramma.
7. Fructus junior, jugis distinctis, magn. auctus.
8. Fructus maturus, jugis in parte superiore gibboso-incrassatis vix distinctis, magn. auctus.
9. Fructus e parte exteriore capituli excerpti sectio transversalis, magn. valde aucta.
10. Fructus e parte interiore capituli excerpti et pressione mutua deformati sectio transversalis, magn. valde aucta; spatium in illa figura linea circumscriptum exhibet eamdem fructus partem sub numero 11 multoties ampliatam.
11. Mericarpii pars ad commissuram excerpta, transversim secta et multoties ampliata ut apparent vitta commissuralis et defectus vittarum in valleculis ubi tantum adsunt guttulæ nonnullæ olei resinosi. — *a*, epicarpium. — *b*, endocarpium. — *c*, vitta commissuralis. — *d*, albumen.
12. Pericarpii pars ad jugum laterale excerpta, transversim secta et multoties ampliata.

EXPLICATIO FIGURARUM TABULE 133.

1. *e Hohenackeria polyodon*, planta magn. nat.
2. Flos per anthesim, magn. auctus.
3. Petalum a facie visum, magn. valde auctum.
4. Stamen a latere visum, magn. valde auctum.
5. Floris diagramma.
6. Fructus junior, magn. auctus.
7. Fructus maturus, magn. auctus.
8. Mericarpii pars superiora facie interiore visa ut apparent dentes calycini et stylopodium stipite breviusculo suffultum.
9. Fructus e parte exteriore capituli excerpti sectio transversalis, magn. valde aucta; spatium in illa figura linea circumscriptum exhibet eamdem fructus partem sub numero 10 multoties ampliatam.
10. Mericarpii pars ad jugum laterale excerpta, transversim secta et multoties ampliata. — *a*, epicarpium cuius cellulæ exteriores nonnullæ in pilum elongantur. — *b*, endocarpium. — *c*, albumen. — (Coss. in Ann. sc. nat.)

^o Icon hæc eximia ut et sequens t. 133, indulgenter consentiente cl. editore G. Masson, e collectaneis *Annales des sciences naturelles* excerptæ.

TABULA 134.

GAILLONIA REBOUDIANA COSS. ET DR.

G. Reboudiana Coss. et DR. ap. Coss. in *Bull. Soc. bot.* II, 250 [1855]; Batt. et Trab. *Fl. Alg.* 389. — *Chouettia Reboudiana* Pomel *Nouv. mat.* 81. — Exs. Kral. *Alg.* 40, 40 bis, Coss. et Kral. in War. 102.

« Frutex humilis, cæspitosus, tortuosus, ramosus, ramis sæpius oppositis, divergentibus, tercibus, cortice albo rimoso, ramis novellis papilloso-furfuraceis, apice infra flores pilis patentibus hispidis. *Folia* ima basi solum mediante vaginula brevissima inter se et cum stipulis connexa *dimorpha*; *caulina* et *ramealia lanceolato-linearia* lineariae, subcarnosa, *parce breviterque hispida*, infra subcanaliculata nervo medio crassiusculo, opposita, in gemmis axillaribus conferto-fasciculata, stipulis interpetiolaribus utrinque sæpius 3, in vaginulis foliorum inferiorum minimis dentiformibus, in vaginulis superiorum herbaceis linearibus inæqualibus, intermedia breviore, laterilibus foliis 4-6-plo brevioribus; *floralia linearis-subsetacea eximie longeque hispido-plumosa*, stipulis interpetiolaribus 8, 6 vel 5 omnino conformibus et æquilongis comitata et inde *involucra* 10-8- vel 7-*phylla* referentia. Flores cymosi, cymis terminalibus et in axillis foliorum superiorum semel vel bis dichotomis ramulis hispido-plumosis. *Involucra flores subæquantia*. *Calyx* tubo oblongo pilis brevibus et longioribus apice glochidiatis hispido, *limbo bipartito sub anthesi brevissimo*, accrescente demum in quovis mericarpio lanceolato cornu referente. Corolla longe et anguste tubulosa, extus breviter villosa, limbo subinfundibuliformi 4-partito. Stamina et stigmata faucem excedentia sed limbo breviora. Fructus oblongus, dicoceus coccis separabilibus monospermis indehiscentibus. » (Coss. in *Bull. Soc. bot.*) 5. Nov.-Maio.

In collibus calcareis apricis, in glareosis et rupestribus regionis Saharensis provinciae Algeriensis; desideratur in reliqua Algeria. — **Sah.** A² : *Berrian!*, in vallibus *Oued El-Bir!*, *Oued En-Nsa* (Reb.), *Kef El-Rakhma!* (Reb.), *Besseroudj* (Reb.), *Ghardaïa* (Perr.), *Metlili!* (Vilm.). — **MAR.** *Ida-Ouchemlal*, *Ida-Oubakil*, *Tamelhat*, *Tazeroualt*, *Akka* (Mard.).

In Algeria et imperio Maroccano tantum nota.

Obs. Cl. doctori Reboud, qui investigationibus ad vegetationem Saharæ orientalis Algeriensis et regionis Plantierum excelsarum provinciæ Algeriensis cognoscendam maxime laboravit, hanc speciem dicatam voluiimus. — *G. Reboudiana* ob folia *floralia subsetacea hispido-plumosa* stipulis æquilonga eis omninoque conformia, omnibus inter se et cum foliis floralibus basi tantum coalitis et inde *involucra* referentibus ad sectionem *Ptilostephus* (Jaub. et Spach *Consp. gen. Gaill.* in *Ann. sc. nat. ser.* 2, XX, 87. — *Jaubertia* Guillemin. in *Ann. sc. nat. ser.* 2, XVI, 60, et in Jaub. et Spach *Illustr. Or.* I, 17, t. 8. — *Gaillonia* sect. *Jaubertia* Boiss. *Or.* III, 16) pertinet, sed descriptio sectionis emendanda, nempe in planta nostra limbus calycinus bipartitus laciniis cornu referentibus, non sexpartitus laciniis setaceis plumosis ut in *G. Aucheri* (Jaub. et Spach *Consp. gen. Gaill.* l. c. 87, et *Illustr. Or.* I, 140; Boiss. *Or.* III, 16. — *Jaubertia Aucheri* Guillemin. l. c. — Exs. Auch. *Mascate* 4680), unica specie hucusque cognita in sectione. — *G. Aucheri* in regno Mascate et in Persia australi crescents a *G. Reboudiana* differt non solum laciniis calycinis involucralibusque setaceo-plumosis sed etiam involucris brevioribus, corollæ tubo breviore apice latiusculæ infundibuliformi, etc. (Coss. gall. *fig. 1. c.*)

EXPLICATIO FIGURARUM.

1-11. *Gaillonia Reboudiana*.

1. Planta florifera et fructifera, caulis ramisque pluribus resectis, magn. nat.

2. Caulis fragmentum in parte inferiore depromptum ad stipulas minimas dentiformes ostendendum, magn. auctum.
 3. Caulis fragmentum in parte superiore depromptum ad stipulas inæquales, intermedia breviore, ostendendum, magn. auctum.
 4. Cyma terminalis magn. aucta.
 5. Flos foliis stipulisque floralibus involucratus, magn. auctus.
 6. Flos involucro destitutus, magn. auctus.
 7. Corollæ pars superior arte fissa et explanata, a facie interiore visa, magn. aucta.
 8. Styli pars superior ad stigma bifidum ostendendum, magn. magis aucta.
 9. Fructus dicoccus coccis calyce accrescenti obsitus, magn. auctus.
 10. Fructus dicoccus,occo altero abortivo, calyce accrescenti obsitus, magn. auctus.
 11. Calycis fructiferi fragmentum ad pilos apice glochidiatos ostendendum, magn. ampliore auctum.

 - 12-13. *Gaillonia Aucheri.*
 12. Flos involucro destitutus, magn. auctus.
 13. Corollæ pars superior arte fissa et explanata, a facie interiore visa, magn. aucta.
-

TABULA 135.

SCABIOSA FARINOSA Coss.

S. farinosa Coss. in *Compt. rend. Acad. sc.* XCVIII [1884], 468, et *Rapp. miss. bot. Tun.* 27, nomen tantum, et in *Lefebvre Not. for. Tun.* 70 absque deser. — Exs. Soc. Dauph. nov. ser. *Tun.* 116.

Frutex glaber, caudice crassitie pollicis diametrum et ultra æquante, *a basi ramosus*, *dumosus*, ramis vetulis divergentibus foliis emarcidis vel saltem foliorum vaginis donatis, *ramis annotinis* erectis, *indurato-lignosis*, saepius glaucescentibus, præsertim superne dense foliatis, *aliis sterilibus*, *aliis in pedunculum elongatum gracilem* folia longe excedentem *productis*. *Folia opposita*, *rigida*, *ob-ovato-spathulata*, *ovato-oblonga oblongave*, obtusa, rarius acuta, *omnia crenata*, in petiolum sensim attenuata, basi dilatata, breviter connata, *glaberrima*, supra intense virentia subverniciosa, subtus *albida* nervosa nervis pellucidis nervo medio a basi latiuscula ad apicem sensim decrescente lateribus filiformibus, inferiora paulo remota, *superiora approximata* et apice *subrosulata*. Pedunculi terminales, 5-30 centim. longi, erecti vel leviter arcuati, graciles, rubescentes, glabri, infra capitulum præsertim pilis brevibus retrorsis pilosiusculi. *Receptaculum* convexum, hemisphæricum, bracteis persistentibus paleaceum. *Involuci foliola* saepius 8, uniseriata, basi breviter coalita, ovato-lanceolata acuta, rarius ovato-oblonga obtusa, per anthesim herbacea, plana, facie utraque dense adpresseque villosa margine ciliata, post anthesim reflexa coriacea crassiuscula ad apicem arefactione plus minus involuta persistentia. Bracteæ corollæ tubo breviores, exteriore involucri phyllis conformes et subæquilongæ ovato-lanceolatae acutæ margine ciliatae, interiores angustiores linearispathulatae acutæ pilis brevibus adpressis dense villosæ. *Flores* apice pedunculorum in *capitulum* multiflorum *subhemisphæricum* dense congesti, irregulares, exteriore majores magisque irregulares. *Involucellum* prismaticum, quadrilaterale, longitudinaliter in utraque facie 2-sul-

catum, ad costas præsertim sericeo-villosum, superne *in limbum erectum 15-20-dentatum* dentibus triangularibus acutis paulo inæqualibus, intus ad basim coronæ in marginem annularem horizontaliter patentem *productum*. *Calyx* ovario adnatus, membranaceus, lævis, superne *infra limbum in collum brevissimum constrictus*, *limbo in aristas 5 elongatas radiato-patentes scabras involucelli coronam longe excedentes diviso*. *Corolla* tubuloso-infundibuliformis, hispidula, irregularis, *limbo albido, roseo vel cœruleo, 5-fido lobis inæqualibus*: anteriore majusculo oblongo, cæteris a lobo anteriore per paria sensim decrescentibus, *lobis omnibus integerrimis* in floribus exterioribus patentibus in interioribus erectis. *Stamina 4*, filamentis ante anthesim recurvatis, per anthesim erectis exsertis. *Ovarium inferum, uniloculare, uniovulatum, in stylum gracilem apice subclavatum productum*. *Fructus indehiscens, oblongus, lævis, involucello inclusus, calycis parte superiore persistente coronatus*. *Semen descendens, albumine carnoso instructum*. ♂. Maio-Jun.

In pascuis montosis, in rupestribus præruptis maritimis insulæ Zembra et peninsulae *Cap Bon* Tunetiae boreali-orientalis.
— **TUN.** *Djezeiret Djamour* (Doum. miss. 1884, Lx miss. 1887, Miss. 1888), *Cap Bon* (Miss. 1883 a cl. Letourneux et Reboud inventa, Miss. 1888), *El-Haouiria*, *Dj. Abd-er-Rahman* ad cacumen (Miss. 1883).

Tunetiae peculiaris.

OBS. *S. farinosa* receptaculo paleaceo, involucello longitudine tota 8-sulcato *in limbum dentatum* producto, calycis limbo *in aristas 5 rigidas* diviso ad sectionem *Succisa* Coult. (*Mém. Dips. in Mém. Soc. phys. et hist. nat. Genev. II, part. 2, 49* emend.; DC. *Prodr. IV, 657* emend.; Benth. et Hook. *Gen. II, 160*). — *Succisa* Mert. et Koch *Deutschl. Fl. I, 743*; Boiss. *Or. III, 130*) pertinet; sed a speciebus in sectione hucusque cognitis habitu, ramis lignosis, foliis omnibus crenatis, involucelli corona 15-20-dentata dentibus tubum dimidium subæquantibus, corolla quinquefida, etc.; eximie distincta.

EXPLICATIO FIGURARUM.

1-8. *Scabiosa farinosa*.

1. Ramus pedunculum jam fructiferum et pedunculos floriferos floribus nondum evolutis gerens, magn. nat.
2. Ramus pedunculum floriferum floribus expansis evolutis et pedunculum floriferum floribus nondum expansis evolutis gerens, magn. nat.
3. Receptaculum paleaceum longitrorsum sectum, magn. auctum.
4. Flos exterior cum bractea, magn. auctus.
5. Flos interior cum bractea, magn. auctus.
6. Corolla nondum aperta arte fissa et explanata, a facie interiore visa, magn. aucta.
7. Involucellum maturum cum calycis limbo persistente, magn. auctum.
8. Involucellum maturum longitrorsum sectum ad fructum maturum ostendendum, magn. auctum.

9-10. *Scabiosa Succisa*.

9. Involucellum maturum cum calycis limbo persistente, magn. auctum.
10. Involucellum maturum longitrorsum sectum ad fructum maturum ostendendum, magn. auctum.

TABULA 136.

PERRALDERIA Coss.

Perralderia Coss. in *Bull. Soc. bot.* VI, 394 [1859], et in *Ann. sc. nat. ser. 4*, XVIII, 209; Batt. et Trab. *Fl. Alg.* 429. — *Grantia* Benth. in Benth. et Hook. *Gen. II*, 332 ex parte.

— *Capitulum* multiflorum, homogamum, *flosculis omnibus hermaphroditis, tubulosis*. Involucrum polyphyllum, foliolis subtriseriatis, exterioribus omnino foliaceis longioribus erecto-patentibus linearis-subteretibus, interioribus linearibus imbricatis flosculos subæquantibus. *Receptaculum* latiusculum, convexum, *nudum*, alveolato-punctatum alveolis punctisque prominentibus. *Flosculorum* corolla tubulosa fere a basi sensim ampliata, superne 5-dentata. *Staminum* filamenta linearis-complanata, ad imam corollam inserta. *Antheræ* basi bicaudatae, caudis subindivisis setiformibus, apice in appendicem linearem productæ. *Stylus* superne cylindraceus, bifidus, cruribus linearibus longiusculis apice obtusis, intus planiusculis lineis papillarum stigmaticarum angustis prominulis ad apicem crurum productis, extus convexiusculis æqualiter et minute puberulis. *Achænia* a basi ad apicem dense longeque *villosa*, *teretiuscula*, eglandulosa, obsolete 10-striata, areola insertionis exacte basilari callo annulari crassiusculo, apice in collum brevissimum abrupte contracta. *Pappus* biserialis, setis seriei exterioris brevissimis paleiformibus basim pappi interioris cingentibus, setis seriei interioris plurimis (circiter 30) fragilibus, scabro-barbellatis, flosculum subæquantibus, intermixtis nonnullis paulo brevioribus. n (Coss. in Ann. sc. nat.)

Plantæ perennes basi frutescentes, puberulo-glutinosæ odore balsameo, ramosæ, dumulosæ, ramis apice monocephalis. *Folia* alterna, *pinnatisecta*, vel *bipinnatisecta* laciniis linearibus crassiusculis divergentibus, superiora indivisa. *Flosculi* albido-lutei vel purpurascentes.

OBS. — Genus hoc novum amicissimo Henrico Le Tourneux de la Perraudière, itinerum nostrorum per Algebriam devotissimo sodali, Floraë Algeriensis et Canariensis indagatori præstantissimo, dum cum vivis versaretur luctuissime dicatum, nunc post obitum præmaturum omnibusque flebilem, in æternum pignus doloris nostri sacratum voluimus. — Genus *Perralderia* ex ordine Compositarum, e tribu Asteroidearum, in subtribu Euinulearum prope *Jasoniam* collocandum. Differt a *Jasonia* foliolis involuci exterioribus longioribus omnino foliaceis linearis-teretiusculis, corollis fere a basi sensim ampliatis, staminum filamentis ad imam corollam insertis, antherarum caudis subindivisis, non laceris, achæniis teretiusculis, non oblongo-teretiusculis, a basi ad apicem dense longeque villosis villis superioribus pappum exteriorem occultantibus, apice in collum brevissimum abrupte contractis, et habitu plane alieno. — *Vieræa* Webb *Phyt. Can.* II, 225 (*Bupthalmi* sp. Brouss. — *Donia* sp. Less. — *Jasonia* sp. DC.) et *Allagopappus* Cass. (*Jasonia* sp. DC.) a *Jasonia* sat differre videntur. — Sectiones generis *Jasoniae* *Chiliadenus* (*Chiliadenus* Cass.) et *Eujasonia* (*Jasonia* Cass.) vix distinctæ, nempe in *J. Sicula* capitula sèpius subdiscoidea et achæniorum pili superiores brevissimi glandulosi more *J. glutinosa*. n (Coss. in Ann. sc. nat.) — *Perralderia* valde affinis etiam *Grantiae* Boiss. (*Diagn. or. ser. 1, vi, 79*, et *Or. III, 243*) cum qua a cl. Bentham (Benth. et Hook. *Gen. II*, 332) conjungitur, sed præsertim differt habitu, capitulis homogamis flosculis omnibus hermaphroditis tubulosis non capitulis heterogamis flosculis radii ligulatis neutris, receptaculo alveolato-punctato non profunde alveolato, achæniis apice in collum brevissimum abrupte contractis non attenuatis, foliis pinnatisectis vel bipinnatisectis laciniis linearibus non foliis indivisis cuneatis in petiolum longe attenuatis.

PERRALDERIA CORONOPIFOLIA Coss.

P. coronopifolia Coss. ap. Kral. *Pl. Alg. exs.* [1858], et in *Bull. Soc. bot.* VI, 395, et in *Ann. sc. nat. ser. 4*, XVIII, 210, t. 12; Batt. et Trab. *Fl. Alg.* 429. — Exs. Kral. *Alg.* 57, War. 103.

« Planta perennis, basi frutescens, saepius spithamea dumulosa, undique puberulo-glutinosa pube furfuracea, odore balsameo fragrans. Caudex lignosus, crassiusculus, cortice fuscemente rimoso, saepius pluriceps, in radicem fusiformem desinens. Caules erecti, inferne frutescentes, superne indurato-herbacei, a basi vel a medio ramosi, ramis teretibus striatis divergentibus apice monocephalis. Folia alterna, petiolata, pinnatisecta laciniis linearibus crassiusculis obtusiusculis divergentibus indivisis vel bifidis vel etiam pinnatisectis; superiora indivisa, lineariteretuscula. Capitula majuscula, erecta, in corymbum generalem laxum disposita, longiuscule pedunculata pedunculo infra capitulum nudo. Involucrum campanulato-hemisphaericum, foliolis exterioribus saepius 8-10 omnino foliaceis erecto-patentibus longioribus et frequentissime flosculos longe excedentibus, interioribus linearibus acutis imbricatis. Flosculi albidi dentibus pallide luteis. Achæniorum villi et pappus albi. » (Coss. in *Ann. sc. nat.*) 27. Mart.-Jun.

In convallibus rupestribus vel petrosis calcareis apricis, in alluviis et alveis glareosis præsertim ditionis Mzab regionis Sahensis provinciae Algeriensis. — **Sah.** A³ : *Guerrara!*, in alluviis *Oued Zegrir!*, *El-Farch!*, *Oued El-Bir!*, *Berrian!* (Mar., Vilm.), *Sidi-Abd-el-Kader-mta-Rakhma!*, *Oued Ourighlou!*, *Ghardaïa!* (Lx, Vilm.), inter *Oued Ourighlou* et *El-Ateuf!*, *El-Ateuf!*, *Beni-Isguen!*, *Oued Neumrat!*, inter *Beni-Isguen* et *Methili!* (Lx), *Methili!*. — O¹ : *Kef El-Fokra* (War.).

In Algeria hucusque tantum nota.

EXPLICATIO FIGURARUM⁽¹⁾.

1. « *Perralderia coronopifolia*, planta caulis nonnullis resectis, magn. nat.
2. Capitulum longitrorsum sectum, flosculis avulsis, magn. vix auctum.
3. Flosculus magn. auctus.
4. Flosculi corolla longitrorsum secta ad staminum insertionem ostendendam, magn. aucta.
5. Stamina 2, magn. valde aucta.
6. Styli pars superior magn. valde aucta.
7. Achænium magn. valde auctum, in parte superiore arte paululum detonsum ad clarius collum et pappi seriem exteriorem ostendendum.
8. Pars superior setæ e serie interiore pappi depromptæ, magn. valde aucta. » (Coss. in *Ann. sc. nat.*)

⁽¹⁾ Icon hæc eximia, indulgenter consentiente cl. editore G. Masson, e collectaneis *Annales des sciences naturelles* excerpta.

TABULA 137.

CENTAUREA TAGANA BROTH.

C. Tagana Broth. *Lus.* I, 369, et *Phyt. Lus.* 69, t. 32; DC. *Prodr.* VI, 566; Willk. et Lge *Prodr. Hisp.* II, 167; Batt. et Trab. *Fl. Alg.* 493. — Exs. Salle *Alg.* 56 sub *C. Africana*, Dur. in Choul. 534, Par. 91, Trib. in Bill. cont. 3737, All. in Soc. Dauph. 2942; Rel. Maill. *Mar.* 81.

Planta perennis, elata, glabra, radice valde crassa, elongata, recta, interdum nodoso-incrassata, cortice rimoso, superne et præsertim basi caulum laciniis angustis fuscescentibus ex parte dilatata petiolorum emarcidorum disjunctis instructa, caulem unicum rarius plures emitte. Caules solitarii, interdum plures, 3-8 decim. longi, erecti, teretes, striati, glabri, inferne foliati, superne subaphylli, parce ramosi ramis rigidis rectis vel leviter arcuatis capitulo ovato-subgloboso terminatis. Folia radicalia magna, plus minus coriacea, intense viridia, facie utraque glaberrima, indivisa, oblonga, inferne attenuata, rarius pinnatifida pinnatisectave, margine dentata dentibus triangularibus obtusis callosis rarius acutis, longe petiolata petiolo inferne sensim dilatato intus canaliculato extus striato plus minus lanuginoso, caulina inferiora alterna radicalibus conformia sed minus longe petiolata, media sessilia subamplexicaulia lyrato-pinnatifida lobis inferioribus minoribus patentibus, summa pauca parvula cauli adpressa integerrima. Capitula terminalia, heterogama, ovato-subglobosa. Receptaculum planiusculum, setis niveis lœvibus erectis achænio papposo æquilongis dense obsitum. Involucrum e squamis pluriseriatis arce imbricatis compositum, squamis lutescentibus superne lineis atro-virentibus parallelis donatis, coriaceis, glabris, ab extimis ad intimas magis magisque elongatis, extimis parvulis ovatis subacutis vel ovato-suborbiculatis integerrimis rarissime margine utraque paulo infra apicem emarginatis, intermediis latis basi truncatis apice rotundatis plus minus scariosis, intimis angustioribus longioribus late linearibus superne in appendicem membranaceo-scariosam ovatam vel oblongam integerrimam productis. Flosculi sessiles, marginales neutri ovario obsoleto stylo destituto, staminibus ad laciniis angustas redactis, disci hermaphroditi; inter flosculos disci et marginales flosculis intermediis ovario cum stylo elongato staminibusque ad laciniis angustas redactis occurunt. Corolla flava, longe tubulosa, tubo in flosculis hermaphroditis inferne angusto, ad staminum insertionem ampliato, in limbum 5-sidum laciniis linearibus acutis tubo subtriplo brevioribus, in flosculis neutris marginalibus graciliore, superne paulo ampliato, in limbum profunde 5-sidum laciniis angustissimis tubo longioribus producto. Stamina 5, in tubo corollæ inserta, filamentis brevibus papillosis, antheris basi caudatis, connectivo in appendicem lineari-lanceolatam abeunte appendicibus inferne coalitis superne liberis triangularibus acutis. Stylus gracilis, teres, in stigma lineari-elongatum exsertum basi annulo pilorum cinctum apice emarginato-bilobum lobis brevibus obtusis productus. Achænia oborata, compressiuscula, obtuse tetragona, glabra, lœvia, superne sape transverse rugosa, pappo breviora, hilo laterali parvulo haud excavato donata, pappo biformi multisetoso persistente coronata, setis demum nigrescentibus externis pluriseriatis inæqualibus rigidis radiato-divergentibus scabris, internis uniseriatis subpaleaceis scabriusculis brevioribus erectis conniventibus. ♀. Fl. Jun.-Jul. Fr. exente Jul.-Aug.

Var. α . TAGANA.

Folia radicalia caulinaque inferiora indivisa, oblonga, obtusa, longe petiolata, rarius lyrato-pinnatifida lobis lateralibus paucis oblongis supremis cum terminali majore confluentibus.

In pascuis montosis et collibus, in dumetosis et sylvaticis, in schistosis. — **Med.** C³ : *La Calle* (DR., Lefr.), *Bône* (Mut., Steinb., DR., etc.), *Philippeville*! (Rav.), *Saint-Antoine*!; *El-Kantour*, in sylva *Mouïa* frequens, *Dj. Sgao* (Reb.); *Taourirt-Guiril*!. — A² : *Alger* (Goug., Bové, D.-J.), *Mustapha* (My), *Guyotville* (Allard), *Bouzaréah*!, *Sidi-Ferruch* (Salle), *Staouéli* (Dur.), *Bou-Ismaël* (Claus.), *Keber-Roumia*!; *Dra-el-Mizan*! (Thév.). — O¹ : *Ouillis*!, *Mostaganem* (Bal.). — **Mont.** C² : *Dj. Edough*! (Trib.), *Dj. Gouffé*!; *Dj. Itche-Ali* (Lefr.). — A¹ : frequens in montium *Djurdjura* regione media (Lx), in ditione *Aüt-Idjer* (Lx), *Tizi-n-Cheria* (Par.), *Dj. Tachentirt* (Thév.). — **TUN.** in Tunetia septentrionali-occidentali : inter lacum *Cejenan* et *Sidi-Athman-el-Ahded*, inter *Tabarque* et *Bab-Abrik* (Miss. 1888), *Bordj El-Hamman* (Lx et Reb.), *Aïn-Draham* (Miss. 1883, Rob.), *Dj. Bir*, *Fedj El-Saha*, inter *Fedj El-Saha* et *Fernana* (Miss. 1883), *El-Fedja* (Sedillot). — **MAR.** *Tanger* (Brouss., Dd., Schousb., Salzm., Webb, Hook. et Ball), *Dj. Kebir* (Goud., Hook. et Ball).

In Lusitania et Hispania.

Var. β . AFRICANA; Bonn. in Morot *Journ. bot.* VII [1893], 163. — *C. Africana* Lmk *Encycl.* I, 664; Desf. *Atl.* II, 294; Batt. et Trab. *Fl. Alg.* 493.

Folia radicalia omnia caulinaque inferiora pinnatisecta foliolis lateralibus utrinque 6-9, oblongis, alternis rarius oppositis, sessilibus, lobis minoribus saepius interjectis, supremis praesertim in petiolum decurrentibus et cum terminali multo majore ovato vel suborbiculato confluentibus.

In collibus et rupestribus. — **Mont.** C² : *Dj. Lekahl* (Reb.); *Dj. Itche-Ali* in clivo septentrionali (Hén.). — **TUN.** in Tunetia austro-orientali : *Aïn-Temran*, *Henchir-Demeur* in cacumine *Dj. Mezemzem* (Lx miss. 1884).

In Algeria et Tunetia hucusque tantum nota.

Obs. *C. Africana* quæ, e specimine in horto Parisiensi olim culto a celeb. Lamarck descripta, primo intuitu foliis radicalibus caulinisque inferioribus pinnatisectis lobis glabris inciso-dentatis secus rachim late decurrentibus speciem distinctissimam constituere videtur, ad *C. Taganam* tanquam varietatem eam retulimus, licet formæ typicæ valde diversæ appareant, nempe in eodem specimine Tunetano inter *Tabarque* et *Bab-Abrik* lecto folia radicalia alia indivisa oblonga alia pinnatifida.

EXPLICATIO FIGURARUM.

1. *Centaurea Tagana* var. *Africana*, caulis replicatus superne resectus, magn. nat.
2. Caulis floriferæ pars superior, magn. nat.
3. Folium radicale, magn. nat.
4. Capitulum longitrorsum sectum, magn. nat.
5. Squama externa a facie exteriore visa, magn. aucta.
6. Squama intermedia a facie exteriore visa, magn. aucta.
7. Squama interna a facie exteriore visa, magn. aucta.
8. Flosculus marginalis neuter, magn. auctus.
9. Flosculus marginalis neuter arte fissus et explanatus, a facie interiore visus, magn. auctus.
10. Flosculus hermaphroditus disci, magn. auctus.
11. Staminum tubus arte fissus et explanatus, a facie interiore visus, magn. magis auctus.
12. Styli pars superior cum stigmate emarginato-bilobo, magn. magis aucta.

TABULA 138.

CENTAUREA CONTRACTA Viv.

C. contracta Viv. *Libyc.* 58, t. 24, f. 1. — *C. coarctata* Spreng. *Syst.* III, 407. — *C. glomerata* Vahl var. *contracta* DC. *Prodri.* VI, 601. — *C. Delilei* Godr. *Fl. Juv.* 27, et ed. 2, 85; Coss. et Kral. in *Bull. Soc. bot.* IV, 365; Walp. *Ann.* V, 356.

Planta annua radice gracili, acaulis, a collo infra capitulum terminalem ramos plures axillares nunc omnes nunc nonnullos tantum valde abbreviatos ad capitulos subsessiles redactos glomerulum efficientes, alios plus minus elongatos, saepius 5-12 decim. longos, prostratos vel erecto-patentes, sulcato-striatos. foliatos rarius subaphyllos, pilis conservoideis pubescentes, apice capitulo terminatos et iterum infra capitulum terminalem ramulos axillares saepius 2-3 alios ad capitulos subsessiles redactos cum terminali glomerulum efficientes, alios plus minus elongatos saepius infra glomerulum singulum solitarios emittens, ramo singulo elongato e collo enato apice semel, bis, ter... ita ramoso. Folia virescentia, facie utraque pilis conservoideis donata, in speciminibus ramis axillaribus elongatis destitutis omnia radicalia subrosulata, in speciminibus ramis lateralibus axillaribus elongatis instructis radicalia et ramealia, radicalia petiolata petiolo complanato inferne subdilatato, pinnatisecta laciniis oblongis pinnatifidis grosse dentatis lobulis dentibusque calloso-mucronatis vel sub-integris, ramealia pinnatipartita vel sinuato-pinnatifida apici ramorum valde approximata saepius sessilia semiamplexicaulia paululum decurrentia. Capitula terminalia, mediocria, subsessilia, ad collum et in apice ramorum in glomerulum dense congesta, heterogama. Receptaculum concaviusculum, fibrillis niveis laevis erexitis achænio papposo longioribus dense obsitum. Involucrum ovoideum vel ovato-oblongum, glabrum, squamis pluriseriatis arce imbricatis compositum, squamis pallide virentibus coriaceis laevis nitidis anguste scarioso-marginatis, ab extimis ad intimas magis magisque elongatis, extimis parvulis ovatis acuminatis intermediisque oblongo-linearibus in appendicem stramineo-pallidam coriaceam plus minus elongatam lanceolato-subulatam spinescentem patentem vel deflexam haud decurrentem, inferne spinulis lateralibus 3-6 pinnatam productis, spina terminali caeteris robustiore et longiore, intimis oblongo-linearibus apice scarioso-subdilatatis spinis saepius obsoletis. Flosculi sessiles, marginales neutri stylo staminibusque omnino destituti, disci hermaphroditici marginalibus longiores. Corolla lutea, longe tubulosa, tubo in flosculis hermaphroditis inferne angusto, ad staminum insertionem ampliato, limbo 5-fido laciniis linear-lanceolatis acutis tubo triplo brevioribus, in flosculis neutris tubo graciliore haud ampliato, limbo 5-fido laciniis tubo duplo brevioribus. Stamina 5, in tubo corollæ inserta, filamentis brevibus papillosis. Stylus gracilis, teres, in stigma linearem exsertum apice emarginato-bilolum lobis brevibus obtusis productus. Achænia minuta, obovata, compressa, laevia, nitida, glabra, fuscescentia, pappo paulo longiora, hilo laterali transverse oblongo-suborbiculato donata, pappo biformi persistente multisetoso coronata, setis albidis externis 2-3-seriatis erectis rigidis, internis 1-seriatis sub-triplo brevioribus subconniventibus. ①. Mart.-Jun.

In pascuis et campestribus, in collibus incultis, in glareosis, alluviis et alveis, in palmetis Tunetio mediae orientalis et praesertim australis et australioris. — **TUN.** prope et ad orientem *Ain-Cherchira*, *Ksar El-Sef*, *El-Djem* (Miss. 1883), *Sfax*

(Esp., Doum. et Bonn. miss. 1884), *Dj. Bou-Hedna*, *Oglet Sidi-Mohamed* (Doum. et Bonn. miss. 1884), *Gafsa* (Doum. et Bonn. miss. 1884, Rob.), in ditione *Beni-Aïechha* (Gran.); *Sidi-Maheddeb* (Doum.), *Bir Knafès* (André), *Bir Oum-Ali* (Lx miss. 1884, Doum. et Bonn. miss. 1884), *Khanget Oum-Ali*, *Dj. Taferma*, *Oued Taferma* (Lx miss. 1884); insula *Djerba* (Kral., Doum. et Bonn. miss. 1884), *Zarzis* (Lx miss. 1884); *Gabès* (Kral., Lx), in alluviis *Oued Gabès*, in ditionibus *Ahouaia* et *Ghomrassen*, *Bir El-Ahmar* (Lx miss. 1884).

In Tripolitana Cyrenaica. Prope *Montpellier* loco dicto *Port-Juvenal* ubi primum a Delile inventa sed advena et cum lanis advecta.

OBS. *C. contracta* involucri ovati squamis imbricatis, intermediis in appendicem spinescentem plus minus elongatam inferne spinulis lateralibus 3-6 pinnatam productis, intimis oblongo-linearibus apice scarioso-subdilatatis spinis saepius obsoletis, flosculis luteis marginalibus 5-fidis flosculis disci brevioribus, pappo biformi setis externis pluriseriatis rigidis internis uniseriatis brevioribus conniventibus ad sectionem *Mesocentron* (DC. *Prodr.* VI, 592) pertinet, quanquam habitu ad sectiones *Melanoloma* et *Seridioides* proprius accedit; habitu *C. involucratam* Desf. (sect. *Melanoloma*) praesertim refert, sed involucri squamis spinescentibus, flosculis marginalibus flosculis disci brevioribus, capitulis glomerulatis, etc. valde distincta. — *C. glomerata* Vahl (*Symb.* II, 94; DC. *Prodr.* VI, 600 excl. var.; Boiss. *Or.* III, 679. — *C. prolifera* Vent. *Descr. jard. Cels* t. 16) in Ægypto inferiore crescentem magis refert, sed involucro glabro, non araneoso, squamis in appendicem spinescentem inferne spinulis lateribus 3-6 pinnatam productis, non subpalmatim in spinulas 3-5 graciles subæquales divisis, achæniis pappo dupli pluriseriato persistente coronatis, non ad setas intimas uniseriatas reflexas apice incurvas redactis.

EXPLICATIO FIGURARUM.

1-11. *Centaurea contracta*.

1. Planta florifera et fructifera, magn. nat.
2. Involucri squama externa, a facie exteriore visa, magn. aucta.
3. Involucri squama intermedia, a facie exteriore visa, magn. aucta.
4. Involucri squama intima, a facie exteriore visa, magn. aucta.
5. Flosculus marginalis neuter, magn. auctus.
6. Flosculi marginalis neutri limbus arte fissus et explanatus, a facie interiore visus, magn. auctus.
7. Flosculus hermaphroditus disci, fimbriulis receptaculi nonnullis auctus, magn. auctus.
8. Staminum tubus arte fissus et explanatus, a facie interiore visus, magn. magis auctus.
9. Styli pars superior cum stigmate basi annulo pilorum cincto, magn. magis aucta.
10. Achænum pappo persistente coronatum, a latere visum, magn. auctum.
11. Achæni pars superior, a facie superiore oblique visa ad pappum interiore ostendendum, magn. aucta.

12-15. *Centaurea glomerata*.

12. Capitulum floriferum, magn. nat.
13. Involucri squama intermedia, a facie exteriore visa, magn. aucta.
14. Achænum cum pappo obsoleto, a latere visum, magn. auctum.
15. Achæni pars superior, a facie superiore oblique visa ad pappum interiore ostendendum, magn. aucta.

TABULA 139.

CENTAUREA KROUMIRENSIS Coss.

C. Kroumirensis Coss. in *Compt. rend. Acad. sc. XCVIII* [1884], 468, et *Rapp. miss. bot. Tun.* 27. nomen tantum: Batt. et Trab. *Fl. Alg.* 500.

Planta annua vel biennis, radice crassa subnapiformi indurata. Caules solitarii vel plures, 3-7 decim. longi, *erecti vel ascendentes*, rigidi, angulati, striati, pubescenti-furfuracei, saepe angulis scabri, in parte superiore ramosi ramis saepius paucis, erecto-patulis, foliatis, *infra capitulum terminalem* incrassatis. *Folia alterna*, rigida, *haud decurrentia*, *inferiora* facie utraque puberula, petiolata, *lyrato-pinnatipartita* lobis lateralibus latere utroque saepius 2-5, a basi sensim ampliatis, oppositis vel plus minus alternis, horizontaliter patentibus, ovato-triangularibus vel oblongis. integris vel plus minus obsolete denticulatis, lobo terminali multo majore interdum maximo ovato ovato-suborbiculato vel oblongo acuto integro, saepius remote denticulato, *media sessilia*, *auriculato-semiamplexicaulia*, ut *inferiora lyrato-pinnatipartita* sed lobis lateralibus paucioribus, *superiora* (*ramealia*) *sessilia oblonga*, *oblongo-lanceolata lanceolatare*, basi *cordato-semiamplexicaulia*, *integra*, margine scabra, facie utraque hirtulo-aspera, interdum apice ramorum approximata capitulum subinvolucrantia. Capitula terminalia, solitaria, medioeria, heterogama. Receptaculum concaviusculum, fimbriulis albidis erectis pappum excedentibus dense obsitum. Involucrum ovoidesubglobosum, *glabrum*, squamis pluriseriatis imbricatis compositum, *squamis* pallide virentibus coriaceis laevibus nitidis ab extimis ad intimas magis magisque elongatis, *exterioribus* ovatis vel ovato-oblongis *in spinam terminalem gracilem* squama paulo longiore vel paulo breviorem *a basi ad medium latere* utroque late membranaceo-dilatatum, *parte membranacea* subscariosa *ad medium usque fimbriata*, *ciliato-spinulosa* laciniis inaequalibus mediis saepius longioribus, *intermediis* ovato-oblongis *in spinam terminalem rigidam validam erectam* demum haud deflexam, *basi* *ovato-acuminatam* crassiusculam *inferne decurrentem latere* utroque praesertim superne profunde fimbriatam, *ciliato-spinulosam*, marginibus incurvis intus concavam, cucullatam, saepe fuscescentem, *intimis late linearibus* apice scarioso-dilatatis subintegris intus plus minus concaviusculis spina terminali omnino destitutis. Flosculi sessiles, marginales neutri stylo destituti staminibusque ad laciniis angustas redactis, disci hermaphroditici marginalibus aequilongi vel paulo longiores. Corolla lutea, superne saepe rubescens, glandulis sparsis praedita, longe tubulosa, tubo in flosculis hermaphroditis inferne angusto, ad staminum insertionem ampliato, limbo 5-fido laciniis linear-lanceolatis acutis tubo ampliato aequilongis, in flosculis neutrī tubo graciliore superne sensim ampliato infundibuliformi, limbo 5-fido laciniis tubo subquadruplo brevioribus. Stamina 5, filamentis brevibus papillosis. Stylus gracilis, teres, in stigma linearem exsertum apice emarginato-bilobum lobis brevibus obtusis productus. Achænia oblonga, compressa, puberula, nitida, laevia, interdum subcostulata, hilo laterali brevi nudo donata, pappo multisetoso persistente tertiam achænii partem aequante coronata, setis externis pluriseriatis erectis rigidis, internis uniseriatis brevioribus conniventibus. ① vel ②. Maio-Aug.

In pascuis et colibus dumetosis, in sylvaticis Tunetiae septentrionalis ad septentrionem fluminis *Medjerda*. — **TUN.** *Bizerte*, *Dj. Antra* loco *Sidi-Ahmed-ben-Nasser*, *Dj. Tehent* parte australi ad *Aïn Zraris* (Miss. 1888); *Aïn-Ahmra* (Miss. 1883), *Aïn-Draham* (Miss. 1883, Rob.), *Fedj El-Saha* (Miss. 1883), *Oued El-Kaïra-Tafrent*, *Sraïa* (Coss.).

In Tunetia hucusque tantum nota, sed in provincia Girtensi Tunetiae confini verisimiliter etiam occurrit.

Obs. *C. Kroumirensis* squamis intermediis in appendicem spinescentem validam utrinque in parte inferiore late membranaceo-dilatata longe fimbriato-spinulosam, intimis late linearibus apice scarioso-dilatatis spina terminali omnino destitutis, flosculis disci marginalibus paulo longioribus vel æquilongis, pappo dupli setis externis pluriseriatis internis uniseriatis, corollis luteis ad sectionis *Mesocentron* seriem *Calcitrapæ* DC. (*Prodr.* VI, 592) pertinet, in qua habitu, ramis angulatis rigidis pubescenti-furfuraceis infra capitulum terminalem incrassatis, foliis non decurrentibus inferioribus mediisque lyrato-pinnatipartitis superioribus sessilibus oblongis oblongo-lanceolatisve juxta *C. Nicæensem* All. (*Ped.* I, 162, t. 74 pessima; *Moris Sard.* II, 447; *Rchb. Ic.* XV, t. 65; *Batt. et Trab. Fl. Alg.* 500. — *C. fuscata* Desf. *Atl.* II, 302, t. 244; DC. *Prodr.* VI, 594; *Guss. Syn.* II, 517. — *C. Sicula* Lmk *Encycl.* I, 674 non L.) in Africa boreali, Hispania, Gallia australiore prope Nicæam a Bellardi lectam sed hucusque non repertam, Italia, Sardinia, Sicilia crescentem collocanda, a qua differt foliis mediis superioribus auriculato-semiamplexicaulibus non semiamplexicaulibus, capitulis paulo majoribus, imprimis squamis inferioribus intermediisque in appendicem spinescentem utrinque in parte inferiore late longiusculeque scarioso-dilatata ad medium usque fimbriato-spinulosam, non in spinam demum deflexam ima basi tantum 1-3-spinulosam abeuntibus infraque spinulas anguste membranaceo-ciliatis.

EXPLICATIO FIGURARUM.

1. *Centaurea Kroumirensis*, plantæ pars inferior, magn. nat.
 2. Pars superior florifer et jam fructifer, magn. nat.
 3. Involuci squama externa, a facie exteriore visa, magn. aucta.
 4. Involuci squama intermedia, a facie exteriore visa, magn. aucta.
 5. Involuci squama intima, a facie exteriore visa, magn. aucta.
 6. Flosculus marginalis neuter, magn. auctus.
 7. Flosculi marginalis limbus arte fissus et explanatus, a facie interiore visus, magn. auctus.
 8. Flosculus hermaphroditus disci cum simbrillis receptaculi nonnullis, magn. auctus.
 9. Staminum tubus arte fissus et explanatus, a facie interiore visus, magn. magis auctus.
 10. Styli pars superior cum stigmate basi annulo pilorum cincto, magn. magis aucta.
 11. Achænum pappo persistente coronatum, a latere visum, magn. auctum.
 12. Achæni pars superior, a facie superiore oblique visa ad pappum interiore ostendendum, magn. magis aucta.
-

TABULA 140.

CENTAUREA FURFURACEA COSS. ET DR.

C. furfuracea Coss. et DR. ap. Bal. *Pl. Alg. exs.* [1853]; Coss. et Kral. in *Bull. Soc. bot.* IV, 363; Batt. et Trab. *Fl. Alg.* 501. — Exs. Bal. *Alg.* [1853] absque numero, Kral. 60.

« *Planta annua, a basi ramosa, ramis duobus vel pluribus saepius infra capitulum caulem brevissimum terminans enatis, brevibus vel plus minus elongatis, decumbenti-diffusis, subsimplicibus*

vel superne ramulos 1-2 emittentibus, sulcato-striatis, pubescenti-furfuraceis, remote foliatis. *Folia haud decurrentia*, pubescentia crispula demum furfuracea, *inferiora petiolata pinnatisecta vel pinnatipartita* laciniis saepius inæqualibus terminali majore oblongis ovatisve subintegris vel grosse dentatis dentibus calloso-mucronulatis, superiora oblonga brevius petiolata pinnatipartita vel subindivisa, *summa capitula bracteantia* et subæquantia. *Capitula apice caulis ramorumque solitaria*, medioeria. *Involucrum* ovoideum, *foliolis* superne parce arachnoideo-pubescentibus, imbricatis, coriaceis, anguste scarioso-marginatis, exterioribus et intermediis in *appendicem* stramineo-pallidam foliolo breviorem patulam vel subdeflexam haud decurrentem *subulatam gracilem spinescentem* inferne *spinulis 2-6 pinnatam productis*, spina terminali cæteris longiore, foliolis intimis apice scarioso-subdilatatis spinis saepè obsoletis. *Flosculi pallide albido-lutescentes, radii neutri radiantibus discum subæquantes*. Achænia minuta, tereti-subcompressa, nitida, glabra, fuscescentia, areola insertionis laterali suborbiculata margine ciliolata. *Pappus* sordide albidus *achænum subæquans*, setis inæqualibus pluriseriatis, intimis multoties brevioribus subconniventibus. n (Coss. et Kral. l. c.) ①. Apr.-Maio.

In collibus petrosis vel argilloso-arenosis apricis, in aggeribus arenæ mobilis, in palmetis, inter segetes, in depressis alluviis et alveis exsiccatis regionis Saharense. — **Sah.** C⁴: *Oglat El-Kebira*, inter Ferkan et Negrin (Iss.), *Negrin* (Biml.), *Besseriani* (Mil.); *Biskra!* (Guy.), *Saada!* (Bal.), *Chegga!*, *Mguebra!*, *Sethil* (Schm.), *Oum-el-Thiou!* (Zick., Mil.), *Tin-edla* (Lx), *Sidi-Rached* (Mil.), *Temacin* (Reb.), *Blidet-Ahmar* (Mil.). — A⁶: *Berrian*, *Guerrara*, *El-Farch*, *El-Lefat*, *Ghardaia*, *Hassi Neunrat*, *Metlili*, *Hadjera-Zerga*, *Ba-Mendil*; *Hassi El-Hadjar*, *Oued El-Taza*, etc. — O¹: *El-Abiod-Sidi-Cheikh* (War.). — **TUN.** *El-Guettar*, *Gouïla* (Doum. et Bonn. miss. 1884), *El-Hamma-Djerid* (Lx miss. 1884), *Tozzer* (Doum. et Bonn. miss. 1884, Lx miss. 1884), *Mouia-el-Cheikh*, *Bir Redjem-Matoug* (Lx miss. 1887); *El-Hamma-Gabès*, *Oued Magroun* (Lx miss. 1886), *Dj. Aziza* (Kral.), *Oued El-Flour*, *Oued Guermassi* (Lx miss. 1887).

In Algeria et Tunetia hucusque tantum nota.

Obs. *C. furfuracea* involueri foliolis in appendicem gracilem spinescentem inferne spinulis gracilioribus 2-6 pinnatam productis ad seriem *Calcitrapeæ* (DC. *Prodr.* VI, 592) pertinet; flosculis radii neutris radiantibus discum subæquantibus in sectione *Calcitrapa* (Cass.; DC. l. c. 596) collocanda, sed habitu, colore flosculorum et pappo achænio subæquilongo a cæteris speciebus hujus sectionis differt. (Coss. et Kral. gall. *Eng.* l. c.)

EXPLICATIO FIGURARUM.

1. *Centaurea furfuracea*, planta florifera et fructifera, magn. nat.
2. Caulis fragmentum folium gerens ad pubescientiam ostendendum, magn. auctum.
3. Involueri squama externa, a facie exteriore visa, magn. aucta.
4. Involueri squama intermedia, a facie exteriore visa, magn. aucta.
5. Involueri squama intima, a facie exteriore visa, magn. aucta.
6. Flosculus marginalis neuter, magn. auctus.
7. Flosculus hermaphroditus disci cum fimbrillis nonnullis receptaculi, magn. auctus.
8. Staminum tubus arte fissus et explanatus, a facie interiore visus, magn. magis auctus.
9. Styli pars superior cum stigmate bifido, magn. magis aucta.
10. Achænum pappo persistente coronatum, a latere visum, magn. auctum.
11. Achænum longitrorum sectum, magn. auctum.

TABULA 141.

CENTAUREA (Sect. STEPHANOCHILUS) OMPHALODES Coss. ET DR.

C. omphalodes Coss. et DR. in Bal. *Pl. Alg. exs.* [1853]; Coss. *Voy. in Ann. sc. nat. ser. 4, IV, 284*, nomen tantum. — *Voluntarella omphalodes* Benth. et Hook. *Gen. II, 477*. — *Amberboa omphalodes* Batt. et Trab. *Fl. Alg. 506*. — Exs. Bal. *Alg. [1853]* absque numero, Kral. 61 et 61 bis.

Planta annua, a basi ramosa, sæpe nana subacaulis. Caules usque 30 centim. longi, erecti vel erecto-patuli, angulati, inferne dense pubescenti-villosi, subtomentosi, superne parcius pubescentes glabrescentesve, sæpius valde ramosi ramis plus minus elongatis rigidis striatis capitulo terminatis. Folia alterna, rigida, facie utraque papillis exsiccatis plus minus aspera, inferiora petiolata pinnatipartita vel pinnatifida lobis lateralibus paucis remotiusculis ovato-oblongis oblongisve obtusis integris inferioribus minoribus terminali majore oblongo, interdum oblonga integra vel plus minus obsolete denticulata in petiolum sensim attenuata, superiora angustiora sessilia vel breviter petiolata pinnatisecta lobis brevibus horizontalibus remotis sæpe crenatis vel subintegris. Capitula terminalia, solitaria, numerosa, mediocria, homogama. Receptaculum concaviusculum, fimbriulis albidis erectis achæniis papposis æquilongis dense obsitum. Involucrum ovoideum, glabrum, squamis pluriseriatis imbricatis compositum, squamis coriaceis lœvibus nitidis ab extimis ad intimas magis magisque elongatis, extimis intermediisque conformibus late albo-marginatis profunde ciliato-spinulosis fimbriatis in spinam terminalem squamæ subæquilongam latere utroque spinulis 1-2 gracilioribus brevioribusque pinnatam productis demum arcuato-recurvam, intimis linearibus anguste albo-marginatis superne eroso-denticulatis in spinam brevem gracilem ima basi latere utroque spinulis parvulis 1-2 erectis inter se et cum terminali contiguis instructam productis. Flosculi sessiles omnes hermaphroditi subæquilongi. Corolla albida, superne sæpe rubescens, longe tubulosa tubo inferne angustiore ad staminum insertionem ampliato, limbo 5-fido laciniis linearibus acutis tubo ampliato duplo brevioribus. Stamina 5, corollam haud superantia vel paulo longiora, filamentis papillosis antheris paulo brevioribus. Stylus gracilis, elongatus, teres, in stigma lineare usque ad basim bifidum lobis demum recurvis productus. Achænia obconica, longitudinaliter sulcato-striata, puberula, hilo laterali basi contiguo parum distincto nudo, apice in coronam incrassatam prominentem nitidam glabram margine intorfexam crenulatam producta, pappo setoso æquilonga vel vix longiora, setis externis albis pluriseriatis scabriusculis, internis uniseriatis brevissimis conniventibus. (1). Maio-Jun.

In pascuis arenosis, in collibus petrosis calcareis vel gypsaceis regionis Saharense. — **Sah.** C⁴ : *Biskra* (Bal., Zick., Schm.). inter *Chegga* et *Aïn-Maach* (Duvayr.), *Mguebra!*, *Oued Semeri* (Reb.), *Tinedla* (Lx, Reb.); *El-Hadjira!*, ad meridiem *El-Hadjira!* (Mil.). — A⁷ : *Ras-el-Aïoun* prope *Laghouat*, in alluvii *Oued Mzi*, *Berrian*, *Guerrara*, *El-Farch*, *Ghardaïa*, *Metlili*, *Bir Bergaoui*; *Anit-el-Moktar*, *Hassi El-Djouad*, *Bir Arefdjî*, *Hassi Tarfaïa*, *Hassi El-Hadjar*, *Guentra-el-Oussif*, etc. — O² : *Mengoub* (Par.), *Metilfa* (Mar.). — **TUN.** inter *Gourbata* et *Oued Taferma*, *Sedada* (Lx miss. 1884), *Gouifla* (Doum. et Bonn. miss. 1884).

In regione Saharensi floræ et in ditione *Touareg* ad *Aïn El-Hadjadj* (Guiard) tantum nota.

OBS. *C. omphalodes* pappo duplice setoso setis intimis uniseriatis brevissimis conniventibus in genere *Centaurea* collocanda, sed squamis albo-marginatis profunde ciliato-spinulosis, flosculis albidis omnibus hermaphroditis,

achæniis obconicis sulcato-striatis apice coronato-incrassatis a speciebus cæteris omnibus generis eximie differt et sectionem propriam *Stephanochilus* Coss. constituit. In Kralik, *Plantæ Algerienses selectæ* n. 61, illustr. auctor *Compendii floræ Atlantice* dixit : « Subgenus, vel quidem genus *Stephanochilus*, achænio obconico, tereti, multi-striato, superne in marginem intreflexam dentata ramulatam incrassato insigne, habitu cum *Centaurea* arcte conjugitur. »

EXPLICATIO FIGURARUM.

1. *Centaurea omphalodes*, planta florifera et fructifera ramis pluribus resectis, magn. nat.
 2. Specimen nanum, magn. nat.
 3. Caulis fragmentum folium gerens, in parte media plantæ depromptum, magn. auctum.
 4. Involuci squama externa, a facie exteriore visa, magn. aucta.
 5. Involuci squama intermedia, a facie exteriore visa, magn. aucta.
 6. Involuci squama intima, a facie exteriore visa, magn. aucta.
 7. Flosculus cum fimbriis nonnullis receptaculi, magn. auctus.
 8. Staminum tubus arte fissus et explanatus, a facie interiore visus, magn. auctus.
 9. Styli pars superior ad stigma bifidum ostendendum, magn. magis aucta.
 10. Achænum papposum, magn. auctum.
 11. Achænum longitrorsum sectum, magn. auctum.
-

TABULA 142.

SILYBUM EBURNEUM Coss. ET DR.

S. eburneum Coss. et DR. ap. Bal. *Pl. Alg.* exs. [1852], et in *Bull. Soc. bot.* II, 366; Willk. et Lge *Prodr. Hisp.* II, 201; Batt. et Trab. *Fl. Alg.* 519. — Exs. Bal. *Alg.* 484, Reb. in Soc. Dauph. 2130.

« Planta annua vel biennis. Caulis saepius clatus, validus, erectus, ramosus, rarius simplex, candidus quasi eburneus, parce pubescenti-araneosus. *Folia* glabrescentia vel subitus pubescenti-araneosa, facie ad nervos subitus prominentes candido-variegata; inferiora radicaliaque saepius amplissima, pinnatifida, lobis inferioribus latis ovato-triangularibus margine plus minus ciliato-spinosis, lobis superioribus multo minoribus in unicum angustum acuminatum longiusculum confluentibus; *superiora* angusta, auriculato-amplexicaulia, auriculis lobisque saepius valide spinosis, spinis candido-eburneis vel superne aureis, *apice in acumen lanceolatum angustum plus minus elongatum productis*. Capitula subglobosa, maxima, pedunculo fere ad apicem foliato. *Involuci* foliolis saltem inferne candido-eburneis, *inferioribus erecto-adpressis appendice* apice *inermi vel brevissime spinosa, interiorum appendice in spinam validam plus minus elongatam patentem producta*. » (Coss. et DR. l. c.) ① vel ②. Apr.-Jun.

In ruderatis et ad vias, in cultis et vervaetis, in pascais montosis et collibus, praesertim in provincia Cirtensi, in reliqua Algeria rarius. — **Med.** C¹: *Saint-Antoine!*; *Kef Derdja!*, *Oued-Zenati!*, *Aïn-Regada!*, *Aïn-Abid!*, *Bou-Nouara!*, *El-Aria!*, *Constantine!* (Reb.); *Takitouni!*. — A¹: *Lavarande* (sec. Batt.). — **Mont.** C¹: *Dj. Ouach!*; *Medina!* (Reb.); *Dj. Maadid* (Lx). — **Plan.** C¹: *El-Kroubs!*, *Aïn-el-Bey* (Reb.), *El-Guerah!*, *Teleghma!*, *Saint-Donat!*, *Ras-el-Ma!*, *Setif!*; *Bordj-bou-Areridj* (Lx); *Melila!*, *Oum-el-Asnam!*, *Batna!* (Perr., Tiss., Duk.), *Oued Batna!*, *Lambèse!*, *Timegrad!*, *Oued Taga!*, *Ksour!*. — A¹: *Har-mela*, inter *Ogla* *Bouda* et *Bou-Saada* (Lx), vel moletrinam *Djelfa!*, *Djelfa!* (Reb.). — O¹: *Saïda!* (Bal.), *Timetlas!*; *Oued Sba*

prope *Daïa* (My), *Daïa* (Clary); *Sidi-Djelloul* (Rx). — **Sah.** C¹ : *El-Kantara!*, *Biskra!* (Bal.). — **TUN.** *Oued Meliana* inf. (Miss. 1883, Barr.), *Mahamedia*, *Dar-el-Bey*, *Djenan-el-Farik*, prope et ad orientem *Aïn-Cherichira* (Miss. 1883), *Sidi-el-Hani* (Doum.); *Souk-el-Khemis!*, *Souk-el-Arba*, *El-Kef*, *Ellez*, inter *Hammam-Zoukra* et *Souk-el-Djema*, *Makteur* (Miss. 1883); *Sfax* (Esp., Rob.); *Feriana* (Rob.), *Oued Zitouna* (Lx).

In Hispania.

OBS. *S. eburneum*, quod nomen a colore albo eburneo caulis, nervorum, foliorumque involucri productum, a *S. Marianum* Gærtn., in regiones easdem crescenti, differt foliis radicalibus inferioribusque in parte superiore sæpius in acumen abrupte contractis, foliorum caulinorum spinis validioribus, foliis superioribus longioribus in acumen lanceolatum angustum plus minus elongatum productis et præsertim involucri forma : in *S. eburneum* involucri foliolis exterioribus erecto-adpressis appendice apice inermi vel acumine brevi prædicto, foliolis interioribus in spinam validam plus minus elongatam patentem productis; in *S. Marianum* involucri foliolis exterioribus sæpius in spinam terminalem validam patenti-recurvam foliolis interioribus æquilongam vel longiorem. (Coss. et DR. gall. ling. l. c.)

EXPLICATIO FIGURARUM.

1-9. *Silybum eburneum*.

1. Caulis floriferi et fructiferi pars superior, magn. nat.
2. Folium inferius a facie superiore visum, magn. nat.
3. Folii inferioris segmentum a facie superiore visum ad nervos eburneos ostendendum, magn. nat.
4. Flosculus cum fimbriulis nonnullis receptaculi, magn. auctus.
5. Stamina magn. aucta.
6. Staminum tubus arte fissus et explanatus, a facie interiore visus, magn. auctus.
7. Styli pars superior ad stigma ostendendum, magn. aucta.
8. Achænum a pappo arte separatum et ab eo paulo remotum, magn. magis auctum.
9. Achænum a facie superiore visum, magn. magis auctum.

10-11. *Silybum Marianum*.

10. Capitulum floriferum ad involucri foliola ostendendum, magn. nat.
11. Achænum, pappo jam deciduo, a latere visum, magn. magis auctum.

TABULA 143.

ONOPORDON ESPINÆ Coss.

O. Espinæ Coss. in *Compt. rend. Acad. sc.* XCVIII [1884], 468, et *Rapp. miss. bot. Tun.* 27, nomen tantum; Bonn. in Morot *Journ. bot.* VII [1893], 163.

Planta biennis, indumento tomentoso albido demum plus minus griseo dense vestita. Caules solitarii, erecti, 15-40 centim. longi, validi, rigidi, longitudine tota foliati, decurrentia foliorum alati. ramosi, ramis parum elongatis folio brevioribus, sæpius brevissimis, omnibus capitulo terminatis. Folia sessilia, radicalia primo anno evoluta valde approximata, in rosulam disposita, demum emarginata, facie utraque velutina, caulinæ alterna, rigida, erecto-patula, parum remota, basi latere utroque in alam integrerrimam crassiusculam latiusculam internodio æquilongam inferne sensim attenuatam producta, radicalibus conformia, pinnatim nervosa, inter nervos laterales primarios validiores

pinnatifida, facie superiore medio longitudinaliter depresso-canaliculata plus minus obsolete nervosa, facie inferiore valide nervosa nervo medio crasso valde elevato a basi ad apicem sensim decrescente nervos laterales primarios robustos emittente *nervis lateralibus primariis* ultra laciniarum lateralium apicem *in spinam rectam induratam acutam abeuntibus*, lacinii triangularibus erecto-patentibus ima basi præsertim margine superiore spinula e nervo laterali primario enata auctis margine inferiore dentibus 1-3 parvulis spinuliformibus præditis, lacinia terminali longiore sensim acuminata acerosa. *Capitula* in genere *parvula*, homogama, terminalia, *involutata* sæpe *sessilia* vel *subsessilia axillaria*, suprema apice caulis aggregata. Receptaculum concavusculum, glabrum, plus minus profunde alveolatum alveolis margine erosio-denticulatis. *Invulnerum* ovoidem, basi convexum arachnoideum, e squamis pluriseriatis arete imbricatis compositum, squamis coriaceis pallide virentibus ab extimis ad intimas magis magisque elongatis, *omnibus erectis adpressis* etiam *demum haud reflexis*, extimis *intermediisque conformibus oblongis oblongo-lanceolatis* dorso subcarinatis margine integerrimis abrupte longeque cuspidatis, intimis angustioribus sæpe rubescens lanceolato-linearibus a basi latiore sensim attenuatis acutis in parte superiore margine ciliolatis. Flosculi sessiles, glabri, omnes hermaphroditi, æquilongi, squamas intimas excedentes. *Corolla albida*, longe tubulosa, tubo inferne angustiore ad staminum insertionem ampliato, limbo 5-fido lacinii linearibus marginibus involutis tubo subquadruplo brevioribus. Stamina 5, corollæ tubo annulatim inserta, filamentis liberis glabris antheris brevioribus. Stylus gracilis, elongatus, teres, in stigma lineare apice tantum bilobum lobis brevibus erectis conniventibus productus. *Achænia obovato-tetragona*, glabra, in facie singula *grosse transverse rugosa*, hilo basilari, pappo achænio sub-4-plo longiore, setis barbellatis pluriseriatis conformibus inferne in tubum brevem concretis composito. (2). Maio-Jun.

In agris incultis, in olivetis, in pascuis et collibus apricis Tunetiae orientalis mediae et australis. — **TUN.** *Monastir*, *Bir Touadjeur*, *Ksar El-Sef*, in planicie *Ouled Meter* (Miss. 1883), *Sfax* (Esp. ubi primum detectum anno 1854, Doum. et Bonn. miss. 1884), inter *Sfax* et *Oued Leben*, *Oued Bateha*, *El-Aïcha* (Doum. et Bonn. miss. 1884); *Sidi-Guenao*, *Dj. Matmata* haud infrequens, *Taoudjout* (Lx miss. 1884).

Tunetiae peculiare.

Obs. *O. Espinæ* pappo plumoso achænio sub-4-plo longiore, involuci squamis omnibus erectis adpressis etiam demum haud reflexis, indumento tomentoso albido affinis *O. polycephalo* Boiss. (*Diagn. Or.* ser. 2, III, 47, et *Or.* III, 564) in Asia minore crescenti, sed abunde differt, habitu, caule alis integerrimis crassiusculis non lobatis spinosis marginato, squamis inferioribus oblongis oblongo-lanceolatis abrupte longeque cuspidatis, non anguste lanceolatis in spinas subulatas abeuntibus, flosculis albidis non roseis, achæniis obovato-tetragonis pappo subquadruplo brevioribus, non obsolete pentagonis pappo triplo brevioribus, etc.

EXPLICATIO FIGURARUM.

1. *Onopordon Espinæ*, plantæ pars superior florifera, magn. nat.
2. Caulis pars inferior, folium radicale a facie superiore visum gerens, magn. nat.
3. Capitulum floriferum involucratum, magn. nat.
4. Capitulum longitrorum sectum ad receptaculum glabrum alveolatum ostendendum, magn. nat.
5. Flosculus cum receptaculi fragmanto, magn. auctus.
6. Stamina magn. magis aucta.
7. Staminum tubus arte fissus et explanatus cum corollæ tubi fragmanto insertionem gerente, magn. magis auctus.

8. Corollæ tubi fragmentum àrte fissum et explanatum ad staminum insertionem ostendendum, magn. ampliore auctum.
 9. Styli pars superior cum stigmate, magn. magis aucta.
 10. Achænum a pappo separatum, magn. auctum.
 11. Pappus plumosus, setis ad medium resectis, magn. auctus.
-

TABULA 144.

TOURNEUXIA Coss.

Tourneuxia Coss. ap. Kral. *Pl. Alg. exs.* [1858], et in *Bull. Soc. bot.* VI, 395, et in *Ann. sc. nat. ser. 4*, XVIII, 211; Benth. et Hook. *Gen. II*, 532.

« *Capitulum* multiflorum, *homocarpum*. *Involucrum* polyphylli foliola subtriseriatim imbricata, dorso tomentosa, margine membranaceo-scariosa. *Receptaculum* concaviusculum, *epaleatum*. *Flosculi ligulati* pappo sub anthesi vix conspicuo, valde inæquales, exteriorum ligula elongata radiante, interiorum plurimorum abortivorum abbreviata. *Achænia uniformia*, *erostria*, glabra, callo brevissimo areolam exacte basilarem cingente, *horizontaliter patentia*, *obovato-cuneata*, a dorso compressa, utrinque margine crassiusculo alata, facie ecostata vel obsolete unicostata, dorso obsolete tricostata vel ecostata, laevia vel irregulariter ad marginem impresso-rugulosa. *Pappus* insertione obliqua ab apice faciei interioris achænii *rectangulatim ascendens*, uniformis, multisetus, setis pluri-seriatis dense plumoso-barbatis *plumulis intertextis*, nonnullis interioribus paulo longioribus apice nudis, demum post disseminationm achænii faciei *adpressis* in planum orbicularem expansis et circum circa radiantibus.

« Planta annua, Saharæ Algeriensis incola, subacaulis, plus minus molliter tomentosa. Pedunculi nudi, elongati, caudiculos abbreviatos vel brevissimos foliatos terminantes. Folia mire variabilia, in eadem planta conformia vel polymorpha, nunc linearia vel oblongo-lanceolata in petiolum sensim attenuata, nunc obovata vel suborbicularia in petiolum abrupte contracta, imo cordata, integra vel grosse inæqualiterque dentata vel pinnatifida. Capitula apice pedunculorum solitaria, flosculis luteis sæpe infra purpurascensibus.

Obs. « Genus hoc novum Cichoracearum, fabrica peculiari achæniorum et pappi inter omnes Scorzonereas insigne, amicissimo Aristidi Letourneux et beato Henrico Le Tourneux de la Perraudière, ambobus itineris nostri recentioris per Saharam Algerensem australiorem strenuis devotisque sodalibus, amicitiae perpetuum pignus esse voluimus. » (Coss. in *Ann. sc. nat.*)

TOURNEUXIA VARIIFOLIA Coss.

T. variifolia Coss. ap. Kral. *Pl. Alg. exs.* [1858], et in *Bull. Soc. bot.* VI, 396, et in *Ann. sc. nat. ser. 4*, XVIII, 212, t. 13; Batt. et Trab. *Fl. Alg.* 550. — Exs. Kral. *Alg.* 67 et 67 bis, Coss. et Kral. in War. 105.

« Planta annua, subacaulis. Radix simplex, gracilis, descendens, caudiculos 2-3 vel plures vel plurimos emittens. Cauliculi præsertim ad apicem foliati, abbreviati vel brevissimi, sæpius arena mobili immersi, et inde primo intuitu folia omnia radicalia videntur. Folia perpaucia vel

plurima, saepius late viridia, pubescenti-tomentosa, in eadem planta conformia vel polymorpha, nunc linearia vel oblongo-lanceolata sensim in petiolum attenuata integra vel Plantaginis coronopifoliae more pinnatifida, nunc obovata vel suborbiculata in petiolum elongatum abrupte contracta imo cordata grosse et inæqualiter dentata rarius integra. Pedunculi aphylli, esquamati, debiles, saepius 3-6 centim. longi, teretes, pubescenti-tomentosi, caudiculos et caudiculorum ramulos terminantes, per anthesim erecti vel ascendentis, dein deflexi vel arcuato-patentes capitulis saepius in arena maturascentibus. Involucrum subcampanulatum, demum campanulato-subglobosum, foliolis subtriseriatis, dorso lanato-tomentosis, margine membranaceo-scariosis, oblongo-lanceolatis acuminatis, exterioribus brevioribus apice saepius arcuatis. Flosculi valde inæquales, exteriores 8-12 ligula elongata radiante involucrum longiuscule superante, interiores saepius plurimi abortivi ligula plus quam dimidio breviore. Achænia fuscescentia, ala marginali albida. Pappus sub anthesi vix conspicuus, demum achænio longior, primum candidus dein albidus. n (Coss. in Ann. sc. nat.) ①. Apr.-Maio.

In aggeribus arenæ mobilis, in depressis arenoso-glareosis, in alluviis et alveis, in palmetis regionis Saharensis; desideratur in provincia Oranensi. — **Sah.** C^o : *El-Amri* (Thieb.), *Saada*, in ditione *Chott Melghir* : *Chegga* (Mil.), *Mguebra* (Perr.), inter *Mguebra* et *Oum-el-Thiour!*, *Oum-el-Thiour*, inter *Sidi-Khelil* et *Tinedla* (Mil.), *Tinedla* (Lx); *El-Hadjira!* (Mil.). — A^o : in ditione *Mzab!*, in alluviis *Oued Eu-Nsa!* et *Oued Mzab!* haud infrequens : *Berrian!* (Vilm.), *Argoub-el-Oussif!*, *Guer-rara!*, *Oued Zegrir!*, inter *Oued Zegrir* et *El-Farch!*, *El-Farch!*, *El-Lefat!*, *Melika* (Lx), *Ghardaia!* (Vilm.), inter *Beni Iss-quin* et *Metlili* (Lx), *Metlili!*, *Hassi-Si-Mohamed-bou-Regba!*, *Ghar-el-Debah!*, *Hadjera-Zerga!*, *Anit-el-Moktar!*, *Hassi El-Djouad!*, *Ngoussal!*, *Ba-Mendil* (Reb.), *Ouargla* (Batt.), *Hassi El-Hadjar*, *Oued-el-Taza*, *Oued Djaouf* (Mil.), *Ain Taïbia* (Guïard). — O^o : *Ain-Sefra* (sec. Batt.).

Saharæ Algeriensi peculiaris.

EXPLICATIO FIGURARUM¹⁾.

1. = *Tourneuxia variifolia*, planta florifera et fructifera foliis omnibus linearibus conformibus, magn. nat.
 2. Specimen alterum ejusdem speciei foliis polymorphis, magn. nat.
 3. Flosculus exterior ex capitulo florifero excerptus pappo vix conspicuo, magn. auctus.
 4. Capitulum longitrorsum sectum foliolis arte expansis ad insertionem achæniorum ostendendum, magn. auctum.
 5. Achænum fere maturum, sed pappo nondum expanso, a latere visum ad insertionem pappi ab apice faciei interioris rectangulatim ascendentis ostendendum, magn. magis auctum.
 6. Achænum maturum post disseminationm, pappo in planum faciei interiori adpressum expanso, a dorso visum, magn. magis auctum. n (Coss. in Ann. sc. nat.)
-

TA B U L A 1 4 5.

ANDRYALA SPARTIOIDES POMEL.

A. spartoides Pomel in herb. sec. Batt. et Trab. *Fl. Alg.* 566. — *A. Ragusina* L. var. *virgata* Coss. in herb.

Planta perennis, cæspitosa, elata, ramosissima, indumento pulverulento stellato etiam in herbariis viridi-flavescente dense obducta, caudice lignoso ligno albo cortice brunneo circumdato, in radicem

¹⁾ Icon haec eximia, indulgenter consentiente cl. editore G. Masson, e collectaneis *Annales des sciences naturelles* excerpta.

minimi digiti æquante crassitudinem profunde descendantem abeunte, superne pluricipite caudiculis sæpius 2-4 centim. longis, apice caules plures rarius solitarios emittentibus. Caules 4-7 decim. longi, erecti, rigidi, indurati, teretes, læves, ima basi ante anthesim dense foliati, longitudine tota ramosi, ramis numerosis, alternis, erectis vel erecto-patulis, rectis vel leviter incurvis, ab infimis ad supremos sensim decrescentibus, gracilibus, virgatis, subaphyllis, capitulo terminatis, pedunculos floriferos laterales simplices inter se distantes plus minus elongatos gerentibus, paniculam generalem laxam corymbiformem efficientibus et, ut caulis, indumento pulverulento nunquam floccoso nunquam rufescente pilis simplicibus intermixtis etiam infra capitulum terminalem semper destituto vestitis. Folia inferiora numerosa, valde approximata, in petiolum attenuata, ambitu lanceolata lyrato- vel sinuato-pinnatifida lobis paucis brevibus remotis oblongis integris obtusis acutiusculisve, jam sub anthesi emarcida et ad petiolorum vestigia persistentia redacta, caulina ramealiaque alterna sessilia linearia integririma magis magisque angustiora mox decidua, suprema bracteiformia minuta, omnia ut caulis ramique indumento pulverulento stellato dense obducta. Capitula terminalia, apice ramorum peduncularumque solitaria, parvula, laxe corymboso-paniculata. Receptaculum convexiusculum, alveolato-reticulatum, alveolorum margine brevissima lacero-dentata et in setas nonnullas inæquilongas producta. Involucrum campanulatum, imbricatum, foliolis planis tenuibus lanceolatis acutis usque ad basim liberis 3-4-seriatis, extimis brevioribus indumento stellato omnino vestitis, intimis in nervo medio prominulo tantum pulverulentis marginibus scariosis, foliolis omnibus demum reflexis. Flosculi lutei, omnes hermaphroditi, inæquilongi, extiores ligula elongata 5-dentata radiante involucrum longiuscule excedentes, cæteri ab exterioribus ad intimos sensim decrescentes, ligulis extus in parte inferiore pilis longiusculis simplicibus donatis. *Achænia alutacea*, omnia conformia, linearciylindracea, inferne paulo attenuata, glaberrima, longitudinaliter aequaliterque 10-costata costis elevatis albidis lævibus margine tenuibus apice in dentes brevissimos erecto-patulos coronulam efficientes productis, hilo circulari basili, pappo setoso niveo achænium duplo aequilongo facillime deciduo, setis uniseriatis inferne concretis rigidis aequilongis barbellatis barbellis inferioribus longioribus superioribus denticuliformibus. 2. Jun.-Aug.

In pascuis et collibus arenosis, in alveis exsiccatis regionis Saharensis, rarius in Planitiesbus excelsis calidioribus; desideratur in provincia Oranensi. — **Plan.** A¹ : *Rocher-de-Sel!* (Reb.), *Djelfa!*. — **Sah.** C¹ : *El-Outaïa!*, *Col de Sfa!*, *Biskra!* (Bal.). — A² : in ditione Hodna : in valle *Oued Oultem*, *Aïn Seba*, inter *Aïn Seba* et *Bou-Saada* (Reb.), *Ed-Dis* (Soll.); *Messad* (Bertr.). — **TUN.** in Tunetia media et australi : prope et ad boreali-orientem *Aïn-Cherichira*, *Aïn-Cherichira* (Miss. 1883); *Oued Cherchara* (Lx miss. 1884), *Feriana* et ad orientem (Rob.), *Oued Zitouna* (Lx miss. 1884), *Dj. Hattig* (Doum. et Bonn. miss. 1884); *Oued Ferd* prope *Ketena*, *Ksar El-Metameur* (Lx miss. 1884).

In Tripolitana ad *Aïn Zara* (Lx).

Obs. *A. spartoides* caudice perenni lignoso superne pluricipite, indumento stellato pilis simplicibus glanduliferis intermixtis omnino destituto, capitulis apice ramorum peduncularumque solitariis *A. Ragusinæ* L. (*Sp.* 1136; DC. *Prodr.* VII, 244; Gren. et Godr. *Fr.* II, 389; Willk. et Lge *Prodr. Hisp.* II, 270; Batt. et Trab. *Fl. Alg.* 566. — *A. laciñata* Lmk *Encycl.* I, 153 [1783]. — *A. lyrata* Pourr. *Extr. Chlor. Narb.* in *Mém. Acad. Toul.* III, 308 [1788]. — Forma foliis oblongo-linearibus acuminatis integris margine utraque dente unico altero productis, capitulis minoribus : *Crepis incana* Lapeyr. *Hist. abr. Pyren.* 483. — *Andryala incana* DC. *Fl. fr.* VI, 445. — Forma capitulis majoribus : *A. macrocephala* Boiss. in DC. *Prodr.* VII, 244. — *A. lyrata* Pourr. var. *macrocephala* Boiss. *Voy.* 393) et præsertim varietatis *ramosissimæ* Boiss. (in DC. *Prodr.* VII, 244, et *Voy.* 393, t. 118 A; Willk. et Lge *Prodr. Hisp.* II, 271. — *A. ramosissima* Boiss. *Elench.* 63) valde affinis, sed differt indumento pulverulento etiam in herbariis viridi-flavesciente, non plus minus floccoso primum incano demum valde rufescente, habitu, foliis jam sub anthesi emarcidis ad petiolorum vestigia redactis, non persistentibus, ramis gracilibus elongatis virgatis subaphyllis, non sæpissime robustis, capitulis minoribus, involuci foliolis 3-4-seriatis, non 2-seriatis, pappo achænium duplo non 5-plo æquante.

EXPLICATIO FIGURARUM

1. *Andryala spartoides*, caudiculi pars superior caules plures emittens, caulibus ramisque resectis, magn. nat.
2. Ramus florifer et fructifer in parte inferiore caulis depromptus, magn. nat.
3. Rami fragmentum, folium oblique a facie inferiore visum gerens ad indumentum stellatum ostendendum, magn. auctum.
4. Pili stellati ex indumento excerpti, magn. magis aucti.
5. Capitulum floriferum magn. auctum.
6. Flosculus radii magn. auctus.
7. Pars superior setæ e pappo excerptæ, magn. magis aucta.
8. Achænum pappo deciduo, magn. magis auctum.

TABULA 146.

ANDRYALA MOGADORENSIS COSS. ET BAL.

A. Mogadorensis Coss. et Bal. *Pl. Mar. exs.* [1867]; Coss. in *Bull. Soc. bot.* XX, 252; Ball *Spic. Marocc.* in *Linn. Soc. Journ.* XVI [1878], 540.

¶ Planta *perennis*, tota indumento molli cinereo-canescente demum rufescente tomentosa, caudice brevissimo sublignoso in radicem descendenter abeunte caules 1-2 vel plures emittentes. Caules erecti vel a basi arcuata ascendentes, indurati, superne ramosi, ramis patentibus. *Folia integra vel obsolete subsinuata obtusa*, infima obovato-oblonga in petiolum brevem attenuata, *caulinæ approximata oblonga vel obovato-oblonga sessilia basi lata semiamplexicaulia*. Capitula apice ramorum laxiuscule cymoso-corymbosa, breviter pedunculata, cymis corymbum generalem efformantibus. *Involucrum lana densa* sordide alba demum rufescente lanato-gossypinum pilis longioribus rigidioribus apice glanduligeris nigricantibus permixtis, foliolis linearibus acutis. Ligulæ aurantiacæ, involucrum superantes. *Achænia fusco-purpurea, oblongo-cylindracea* inferne attenuata, sub-1 o-striato-costata, costis concoloribus. ♀ (Coss. in *Bull. Soc. bot.*) 27.

In arenosis et rupestribus maritimis. — MAR. in maritimis ab urbe Saffi meridiem versus (Hook. et Ball), in insula Mogador (Bal., Hook. et Ball), El-Ksima, Dar-Ould-Delimi, Oued Debey, Assaka (Mard.).

Imperio Maroccano peculiaris.

OBS. — Caudice perenni, caulibus induratis, nonnullisque aliis notis ad *A. Ragusinam* L. collocanda, sed abunde distincta foliis omnibus obtusis integris vel obsolete subsinuatis, caulinis basi lata semi-amplexicaulibus, pedunculis brevibus, involueri foliolis praeter lanam pilis longioribus glanduliferis donatis, achæniis duplo brevioribus oblongo-cylindraceis costis concoloribus, non linearci-cylindraceis costis albidis. ♀ (Coss. in *Bull. Soc. bot.*)

EXPLICATIO FIGURARUM.

1-6. *Andryala Mogadorensis*.

1. Planta florifera et fructifera, caule altero resecto, magn. nat.
2. Rami fragmentum, folium a facie superiore visum ad indumentum stellatum ostendendum gerens, magn. auctum.

3. Pili stellati ex indumento excerpti, magn. magis aucti.
 4. Flosculus radii magn. auctus.
 5. Setæ pars superior e pappo excerptæ, magn. magis aucta.
 6. Achænum pappo deciduo, magn. auctum.

 7. *Andryala Ragusina*.
 7. Achænum pappo deciduo, magn. auctum.
-

TABULA 147.

CYCLAMEN AFRICANUM BOISS. ET REUT.

C. Africanum Boiss. et Reut. *Pug.* 75; Planch. in *Fl. des serres*, VIII, 249, t. 841 (var. *macrophylla* ab cultura obtenta); *Bot. Mag. ser. 3*, XXV, t. 5758; Baker *Syn. sp. Cyclam.* in *Gard. Chron. nov. ser. XIX* [1883], 340; Batt. et Trab. *Fl. Alg.* 720. — *C. Europæum* Desf. *Atl. I*, 167 non L. — *C. Neapolitanum* Duby in DC. *Prodr. VIII*, 57 ex parte quoad patriam Algeriam non Ten.; Munby *Fl. Alg.* 20. — *C. Saldense* Pomel in *Bull. Soc. bot. XXXVI*, 354; Batt. et Trab. *Fl. Alg.* 720. — Exs. Bové *Alg.* [1839], Dur. in Choul. 538, Paris 108, Reb. in Soc. Dauph. 2177.

Planta perennis, tuberosa, *tubere globoso-depresso rapiformi*, rarius subtus applanato, magnitudine valde variabili, latitudine 5-25 centim. longo, crasso, solido, nigrescente, *valde rugoso*, circumcirca sed sæpius in parte rotundata inferiore fibrillas radicales graciles flexuosas ramosas plus minus elongatas emittente. *Folia magna, crassiuscula, plurima, hiemalia*, omnia radicalia, *post anthesim explicata*, nunc ex tuberis parte depressa si tuber humo haud vel vix obrutum, nunc ex rhizomatis erecti apice si tuber in humo plus minus profunde situm enata, longe petiolata *petiolo erecto, robusto, rigido, sulcato, glabriuscule, limbo patente crassiusculo, ovato acuto vel rotundato*, rarius 5-7-lobato lobis angulatis, margine angustissime revoluto, *grosse inæqualiterque crenulato-dentato* dentibus obtusis, rarius subintegro vel etiam integerrimo, facie utraque glabro, supra intense viridi concolore sæpe formose variegato, subtus pallidiore, *basi profunde cordato* sinu nunc late aperto nunc angusto interdum clauso, lobis lateralibus late expansis. *Pedunculi* ex eodem tubere 4-10 enati, *robusti, teretes, 8-25 centim. longi, præsertim ad apicem dense minuteque papilloso-glandulosi, petiolis æquilongi vel sæpius longiores, floriferi erecti, rigidi, apice arcuato-recurvi, fructiferi spiraliter convoluti*. *Flores majusculi, autumnales, ante foliorum explicationem jam expansi*, apice peduncularum nutantes, solitarii, fragrantes. *Calyx* 6-8 millim. longus, erectus, persistens, 5-fidus, dense minuteque glandulosus, *laciniis* tubo longioribus rarius æquilongis, *ovato-acuminatis*, sæpius longe *cuspidatis*, margine ciliato-glandulosis *inæqualiter eroso-denticulatis* rarius integris. *Corollæ* tubo inflato, suburceolato, membranaceo-coriaceo, late aperto, calyci æquilongo, limbo 5-fido *laciniis* paulo supra calycem refractis, 15-25 millim. longis, *tubo triplo æquilongis, carneis vel pallide roseis*, paulo contortis, *late ellipticis oblongis oblongo-linearibusve* rotundato-obtusis vel acutis, *fauce* late aperta dense maculato-purpurea, ob plicam singulæ laciniæ refractæ *pentagona, lateribus plus minus lunulato-concavis ad extremitatem singulam in cornu obtusum brevem ampliatis*. *Stamina* 5, ima basi tubi corollæ inserta, eo æquilonga vel breviora, inclusa, laciniis opposita, subsessilia, erecta, ovario adpressa, conniventia, antheris superne acuminatis,

intus rimis duabus longitudinalibus dehiscentibus, extus glanduloso-verrucosis verrucis rubescientibus. *Stylus simplex*, erectus, *haud* vel vix *exsertus*. Capsula calyce persistente involucrata, coriacea, glabra, subglobosa, apice in valvas plures ad medium usque et ultra longitudinaliter dehiscens. *Semina matura plurima, majuscula, nigrescentia, sessilia, irregulariter globosa, ad hilum linearem brevem profunde depressa, undique dense minuteque foveolata.* 2. Fl. Sept.-Jan. Fol. Nov.-Maio.

In pascuis et collibus dumetosis, in sylvaticis, glareosis et fissuris rupium, in regione Mediterranea et Montana provinciarum Cirtensis et Algeriensis; in provincia Oranensi hucusque nondum observatum. — **Med.** C³: *Bône* (Krém., Trib.), *Dj. Edough* (Duk., Reb., Lx, Doum.), inter *Stora* et *Philippeville*, *Philippeville* (Goss.), *Djidjelli* (Sim.), *Bougie* (Pomel); *Kef Derdja* (Lx), *Souk-Ahras* (Reb.), *Dj. Mahouna!*, *Guelma* (Krém., Doum.), *Sidi-Mecid* (Hen., Reb.), *Dj. Zouara* (J. Reb.), *Dj. Bou-Chenak* (J. Reb.), *Constantine* (Reb.). — A³: *Fort-National* (Lx), *Dra-el-Mizan* (Thev.), *Djurjdura* in montibus frequens (Lx); *Alger* (Fauché, My, Boiss. et Reut., etc.), *Mustapha* (Jam.), inter *Guyotville* et *Cheraga* (Côme), *Kouba* (Paris), *Maison-Carrée* (Dur.), ditione *Sahel* (Jam., Lefebv.), *Dalmatie* (Lefebv.), *Blidah* (Lefebv., Miergues), *Medeah* (Deb.), inter *Medeah* et *Boghar* (Deb.). — **Mont.** C³: *Kef Sidi-Driss*, *Dj. Sgao*, *Dj. Bou-Cherf*, *Dj. Tababor* (Reb.), *Adghar-Amellal* (Goss.), *Dj. Maadid* (Lx). — A²: in sylva *Akfudou* (Lx), *Beni Bou-Addou* (Goss.), *Dra-el-Mizan* (Thev.), *Agouni-el-Haoua* (Lx), in fauibus *Chiffa*, *Dj. Mouzaïa* (Deb.). — **TUN.** in sylva *Aïn-Draham* (Rob.), *Fedj El-Saha* (Miss. 1883), *El-Fedja* (Patouillard), *Oued Baghla* (Goss.).

In Algeria et Tunetia boreali-occidentali provinciae Cirtensi confini tantum notum.

OBS. *C. Africanum* floribus majusculis autumnalibus, corollæ laciniis tubo triplo æquilongis, sauce pentagona lateribus plus minus lunulato-concavis ad extremitatem singulam in cornu obtusum brevem ampliatis *C. Neapolitano* Ten. (Nap. III, 197, t. 118; Gren. et Godr. Fr. II, 460; Boiss. Or. IV, 12; Baker Syn. sp. Cyclam. I. c. 3'10; Caldesi in Parl. It. VIII, 668. — *C. hederifolium* Willd. Sp. I, 810 non Ait.; Koch Syn. 680; Gaud. Helv. II, 74; Viv. Dalm. II, 148; Rchb. Ic. XVII, t. 47. — Exs. Irat in Bill. Gall. 1539, Rel. Maill. 1424, Cheval. in Soc. Dauph. 872; Mabill. Cors. 251, Reverch. 156; Savi in Bill. It. 2312, et in Sch. et Wint. herb. norm. 135) in Gallia, Helvetia, Corsica, Italia, Dalmatia, Serbia, Roumelia, Græcia et Cypro crescenti valde affinis, sed ab illo differt foliis magis crassiusculis sæpius ovatis, non sæpissime 5-7-lobatis, petiolis pedunculisque robustioribus, florescentia paulo magis serotina ab ineunte Septembri non jam ineunte Augusto, floribus paucioribus, petalorum laciniis apice magis rotundatis et imprimis tubere globoso-depresso rapiformi rugoso-tuberculato non irregulariter discoideo-depresso applanato lœviuseulo.

EXPLICATIO FIGURARUM.

1. *Cyclamen Africanum*, planta florifera et jam fructifera, magn. nat.
2. Folium cum petioli parte superiore, limbo subintegro a facie superiore viso, in alio specimine depromptum, magn. nat.
3. Folium cum petioli parte superiore, limbo 7-lobato a facie superiore viso, in alio specimine depromptum, magn. nat.
4. Flos ante anthesim cum pedunculi parte suprema papilloso-glandulosa, magn. auctus.
- 4a. Flos per anthesim, corolla staminibusque ablatis ad calycem eroso-denticulatum ostendendum, magn. auctus.
5. Flos explanatus cum pedunculi parte suprema papilloso-glandulosa, a latere visus, magn. auctus.
6. Flos explanatus longitrorsum sectus, magn. magis auctus.
7. Stamen a facie interiori visum, magn. auctum.
8. Stamen a facie exteriori visum, magn. auctum.
9. Pedunculi fructiferi spiraliter contorti pars superior, magn. nat.
10. Semen ab hilo linearis visum, magn. auctum.
11. Seminis sectio ad embryonem rectum ostendendum, magn. aucta.

TABULA 148.

CYCLAMEN LATIFOLIUM SIBTH. ET SM.

C. latifolium Sibth. et Sm. *Græc.* II, 71, t. 185; Griseb. *Spic. Rumel.* II, 5; Boiss. *Or.* IV, 12. — *C. Persicum* Mill. *Diet.* n. 5, nomen antiquius sed rejiciendum nempe species in Persia hucusque nondum visa; *Bot. Mag.* t. 44; Duby in DC. *Prodr.* VIII, 57; Baker *Syn. sp. Cyclam.* in *Gard. Chron.* nov. ser. XIX [1883], 339. — *C. hederifolium* Sm. *Græc. Prodr.* I, 128 non Ait. — *C. Aleppicum* Fisch. ined. — *C. Punicum* Doum. in *Bull. Soc. bot.* XXV, 136; Pomel in *Bull. Soc. bot.* XXXVI, 356; Batt. et Trab. *Fl. Alg.* 720. — *Cyclaminus Persica* Bonn. in Morot *Journ. bot.* VII [1893], 194. — Exs. Auch. *As. min.* 2613, Rel. Maill. *Syr.* 1425; Reverch. *Cret.* 105.

Planta perennis, tuberosa, *tubere regulari discoideo-subdepresso placentiformi*, latitudine saepius 3–5 interdum usque 10 centim. longo, crasso, solido, nigrescente, laeviusculo, circumcircum fibrillas radicales graciles flexuosas ramosas plus minus elongatas emittente. *Folia magna*, plurima, *autumnalia*, omnia radicalia, *ante anthesim jam explicata*, paulo post anthesim vere ineunte plus minus emarcida, nunc ex tuberis parte depressa si tuber humo haud vel vix obrutum, nunc ex rhizomatis erecti apice si tuber in humo plus minus profunde situm enata, longe petiolata, *petiolo erecto, robusto, rigido*, laevigato, inferne angustiore, superne sensim dilatato, *apice cuneato-dilatato*, limbo patente *ovato vel ovato-suborbiculato* obtuso acutiusculove, margine *exangulato*, angustissime revoluto, *tenuiter inaequaliterque crenulato*, facie utraque glabro, supra plus minus viridi saepè nervis albidis anastomosantibus variegato, subtus pallidore, nunc et saepius basi profunde *cordato* sinu late aperto angusto etiam clauso *lobis lateralibus* late expansis rotundatis secus petiolum *latiuscule decurrentibus*, nunc subcordato lobis lateralibus parum expansis secus petiolum plus minus decurrentibus, nunc basi late truncato sinu lobisque lateralibus omnino destituto. *Pedunculi* ex eodem tubere saepius 4–12 enati, complanati, laevigati, 12–20 centim. longi, præsertim ad apicem dense minutissimeque papilloso-glandulosi, *folia excedentes*, *floriferi* erecti vel ascendentes apice arcuato-recurvi, *fructiferi* superne sensim incrassati medio arcuato-reflexi etiam demum *nunquam spiraliter convoluti*. *Flores* in genere *majusculi*, *hiemales vernalesque*, post foliorum *explicationem expansi*, apice pedunculorum nutantes, solitarii, fragrantes vel inodori (sec. Baker). *Calyx* 7–9 millim. longus, erectus, persistens, ad basim usque 5-fidus, dense minuteque glandulosus, *laciniis late ovatis*, aestivatione *contortis*, extus nervosis, marginè albidis lutescentibusve integerrimis, interdum obsolete denticulatis. *Corollæ* tubo inflato, suburceolato, membranaceo-coriaceo, late aperto, calyci æquilongo vel paulo longiore, limbo 5-fido *laciniis* refractis, 22–30 millim. longis, *tubo triplo et ultra æquilongis*, albis, roseis vel purpureis, subcontortis, *late oblongis vel oblongo-spathulatis* obtusis acutisve, *fauce* late aperta, intense maculato-purpurea, *annulari*, *integerrima*, dentibus omnino destituta. *Stamina* 5, ima basi tubi corollæ inserta, eo æquilonga vel breviora, inclusa, laciniis opposita, sessilia vel subsessilia, erecta, ovario adpressa, conniventia, antheris inferne inflato-subgibbosis superne acuminatis intus rimis duabus longitudinalibus dehiscentibus extus glanduloso-verrucosis verrucis nigrescentibus. *Stylus* simplex, erectus, *exsertus*, corollæ faucem parum excedens. *Capsula* calyce persistente involucrata, eo paulo longior, coriacea, glabra, globosa, apice truncata in valvas plures ad medium usque et ultra longitudinaliter dehiscentes. *Semina* matura plurima, *lutescentia*, sessilia, irregulariter globosa, ad hilum linearem brevem profunde depressa, *dense minuteque papillata*. 2. *Fl.* Jan.-Apr. etiam Maio ineunte, *Fol.* Sept.-Maio.

In pascuis et collibus dumetosis, in glareosis et rupium fissuris, in alluviis et agris Tunetiae septentrionalis orientalis. — **TUN.** *Utique* (sec. Lx), *Bordj Sebala* (Lx miss. 1884), *Oued Meliana inf.* (sec. Doum.), *Hammam-el-Lif* ubi primum anno 1874 a cl. Doumet-Adanson detectum, *Dj. Bou-Kournein* præsertim frequens in cacumine (Doum. miss. 1883, Lx, etc.), *Dj. Regas* (Lx miss. 1884), *Kroumbalia* (sec. Doum.).

In Macedonia australiore, Græcia (sec. Sibth. sed verisimiliter pro specie altera (*C. Græcum*) nempe a recentioribus non visum), in insulis Chio, Creta, Rhodo, Cypro, in Asia minore australiore, Syria, Palæstina. — Jam a sæculis pluribus in hortis cultum et quasi immutatum.

Gbs. *C. latifolium* pedunculis fructiferis in medio arcuato-reflexis etiam demum nunquam spiraliter convolutis a speciebus omnibus generis eximie distinctum. — Florescentia vernali et florum magnitudine ad *C. repandum* Sibth. et Sm. (*Græc.* II, 7², t. 186; Koch *Syn.* 680; Guss. *Syn.* I, 235; Gren. et Godr. *Fr.* II, 460; Rehb. *Ic.* XVII, t. 47; Willk. et Lge *Prodr. Hisp.* II, 643; Boiss. *Or.* IV, 12; Baker *Syn. sp. Cyclam.* l. c. 339; Batt. et Trab. *Fl. Alg.* 720. — *C. vernum* Lobel *Ic.* 605; Viv. *Dalm.* II, 148; Moris *Sard.* III, 22. — *C. hederæfolium* Ait. *Hort. Kew.* I, 196; *Bot. Mag.* t. 1001. — Exs. Bourg. *Cors.* 324, Mabille 252, Reverch. 32; Savi in Sch. et Wint. *It.* 136, Hutt. Port. Rig. 128) in Algeria, insulis Balearibus, Gallia australi, Corsica, Italia, Sardinia, Sicilia, Istria, Dalmatia, Roumelia, Græcia et in insula Creta crescentem accedit, sed longe differt foliis ovatis vel ovato-suborbiculatis exangulatis crassiusculis, non ovatis membranaceis crenato-repandis lobis paucis latis apice rotundatis apiculatis, petiolis erectis non prostratis, corollæ laciniis saepius latioribus et imprimis tubere glabro lœviusculo majore, non tubere velutino-tomentoso parvo nigro-rufescente.

EXPLICATIO FIGURARUM.

1. *Cyclamen latifolium*, planta florifera et vix fructifera, magn. nat.
2. Foliolum cum petioli parte superiore, a facie inferiore visum, magn. nat.
3. Flos explanatus cum pedunculi parte suprema arcuato-reflexa, magn. auctus.
4. Flos explanatus longitrorsum sectus, magn. magis auctus.
5. Stamen a facie interiore visum, magn. auctum.
6. Stamen a facie exteriore visum, magn. auctum.
7. Rhizoma ex tubere enatum apice pedunculos fructiferos gerens, magn. nat.
8. Semen maturum ab hilo visum, magn. nat.
9. Semen maturum a dorso visum, magn. nat.
10. Semen maturum a latere visum, magn. nat.
11. Semen maturum ab hilo visum, magn. auctum.
12. Seminis sectio ad embryonem rectum ostendendum, magn. aucta.

TABULA 149.

MATTIA (MATTIARIA) GYMNANDRA Coss.

M. gymnandra Coss. ap. Bourg. *Pl. Alg. exs.* [1856], et in *Bull. Soc. bot.* III, 708; Batt. et Trab. *Fl. Alg.* 615. — Exs. Bourg. *Alg.* 24 c.

— Planta perennis, sericeo-villosa. Caudex lignosus, pluriceps, superne vestigiis petiolorum emarginatorum stipatus. Caules erecti, folia radicalia 2-3-plo superantes, inferne simplices, superne in ramos 2-4 florigeros subaphyllos cymoso-corymbosi. Folia mollia, integra, radicalia

plura laxe rosulata sericeo-pubescentia oblonga obtusiuscula acutiusculave in petiolum sæpe elongatum attenuata, caulina plura inferioribus subconformia brevius petiolata sessiliave, superiora molliter villoso-subtomentosa oblongo-lanceolata sessilia. Flores in racemos 2-4 scorpioideos aphyllos vel basi tantum foliatos primum densifloros sæpius in paniculam terminalem subsecundam congestos dein laxiusculos corymbum efficients dispositi. Pedicelli calycem subæquantes vel paulo longiores. Calyx molliter villoso-subtomentosus, in lacinias lineares obtusiusculas 5-partitus, persistens, sub fructu reflexus. *Corolla* ochroleuca, calycem subæquans, glabra, *regulariter tubulosa*, ad tertiam vel quartam partem superiorem 5-loba, *lobis erectis ovatis* vel triangularibus *brevibus* obtusis. Fornices cum staminibus ad tertiam partem superiorem tubi insertæ, lanceolato-triangulares obtusæ, glabræ. *Stamina longe exserta, filamentis subfiliformibus anthera subtriplo longioribus*, antheris ovato-oblongis obtusis. Ovarium 4-lobum. Stylus elongatus, exsertus, stigmate capitellato-punctiformi. Nuculæ depresso-complanatæ, ventre stylo basi pyramidato quadrangulari affixæ margine membranaceo fuscescente plano subsinuato-denticulato latissime cinctæ, disco laevi. n (Coss. in Bull. Soc. bot.) 27. Jun.-Jul.

In pascuis petrosis, in declivibus glareosis regionis montanæ superioris provinciæ Algeriensis. — Mont. A²: in montium Djurdjura occidentalium verticibus: *Beni Bou-Gherdan* (Lx), *Dj. Heizer!* (Thev., Lx), inter *Beni Bou-Addou* et *Beni Yala* (Lx), *Tizi-n-Tesselen!* (Perr.), *Tizi Ougoulmim* (Thev.), *Thabouri-Bouzgueur* (Lx), *Tizi Hout* (Lx).

Provinciæ Algerensi peculiaris.

Obs. Planta hæc eximia corollæ lobis ovatis triangularibus brevibus, fornicibus ad tertiam partem superiorem tubi corollæ insertis, nucularum margine subsinuato-denticulato, inflorescentia in racemos post anthesim laxiusculos in corymbum dispositos, et imprimis staminibus longe exsertis filamento anthera longiore, in genere *Mattia* subgenus *Mattiaria* constituere debet. — Subgenus *Mattiaria* inter genera *Mattia* Schult. (DC. Prodr. X, 167; Boiss. Or. IV, 273) et *Paracaryum* Boiss. (Diagn. Or. ser. 1, xi, 129, et Or. IV, 253) quasi medium tenet, nempe corolla tubulosa lobis erectis ad genus *Mattia* pertinet dum lobarum brevitate latitudineque ad genus *Paracaryum* accedit. (Coss. gall. ling. 1. c.) — *M. gymnandra* corollæ lobis ovatis brevibus obtusis staminibusque longe exsertis *Mattiæ Bungei* Boiss. (Or. IV, 274) in Persia boreali-orientali crescenti affinis, sed ab illa abunde differt habitu, foliorum latitudine, fornicibus ad tertiam partem superiorem tubi non prope basim insertis, etc.

EXPLICATIO FIGURARUM.

1. *Mattia gymnandra*, planta fructifera, magn. nat.
2. Ramus florifer, magn. nat.
3. Flos a latere visus, magn. auctus.
4. Flos, calyce ablato, a latere visus, magn. magis auctus.
5. Corolla arte fissa et explanata, a facie interiore visa ad fornices et staminum insertionem ostendendum, magn. ampliore aucta.
6. Ovarium cum stylo, magn. ampliore auctum.
7. Nuculæ maturæ, magn. auctæ.
8. Nuculæ maturæ longitrorsum sectæ, magn. auctæ.
9. Semen maturum, magn. auctum.
10. Embryo magn. auctus.

TABULA 150.

SCROFULARIA TENUIPES Coss. ET DR.

S. tenuipes Coss. et DR. ap. Kral. *Pl. Alg. exs.*; Coss. in *Bull. Soc. bot.* IX, 175; Batt. et Trab. *Fl. Alg.* 631. — Exs. Coss. in Kral. *Alg.* 136, Duk. in Choul. 540; Rob. *Tun.* in *Soc. Dauph.* 529.

« *Planta perennis, glanduloso-pubescent, caudice crassiusculo saepius caules plures emittente. Caules herbacei, 1-2 metr. longi, erecti, ascendentes vel diffuso-ascendentes, saepius ramosi ramis elongatis subsimplicibus superne ramulos inflorescentiae emittebantibus, tetragoni angulis obtusiusculis. Folia petiolata, petiolo haud auriculato, ovata vel trianguli-ovata basi profunde cordata, acutiuscula vel obtusiuscula, inaequaliter argute dentata vel crenata, nervis lateralibus parce ramosis vix prominentibus venulis crebre reticulato-anastomosantibus sed vix conspicuis. Panicula elongata, laxe foliata, cymis longiuscule graciliterque pedunculatis laxe plurifloris bisquater dichotomis, pedunculis gracilibus filiformibus crebre brevissimeque pubescenti-glandulosis, pedicellis etiam florum in axillis dichotomiarum sitorum calyce demum multoties longioribus, bracteolis parvis linearis-subulatis. Calyx corolla subduplo brevior, laciniis ovato-lanceolatis acuminatis immarginatis. Corolla circiter 5 millim. longa, flavo-virens dorso plus minus violaceo-purpurascens, tubo haud ventricoso, fauce ampla, lobis 2 superioribus porrectis cæteris subduplo longioribus. Stamina subinclusa, quinti sterilis rudimento obovato-suborbiculato integro. Capsula parvula, subglobosa breviter apiculata.* » (Coss. in *Bull. Soc. bot.*) 27. Jun.-Aug.


In dumetosis et sylvaticis umbrosis humidis, in erosis, ad fontes et secus rivulos. — **Med.** C²: Dj. Msala!, Oued Tamnart!, Collo!, Oued Guebli!, Oued Abaïch!; in insulis Mansouria (Rx). — **Mont.** C³: Dj. Edough! (Lx, Krém., Duk., Trib., etc.); Dj. Zouara (J. Reb.), Dj. Sgao, Kef Souma (Reb.), El-Ma-Berd!. — A¹: in sylva Akfadou, Agoulnim-Aberkan (Lx). Fort-National (Deb.). — **TUN.** in Kroumiria: Aïn Babouch, ad fontem Ain Draham, Aïn-Draham, ad boreali-occidentem Aïn-Draham (Miss. 1883, Rob.).

In Algeria et Tunetia hucusque tantum nota.

Obs. *S. tenuipes* ad sectionem *Scorodonia* (G. Don, Benth. in DC. *Prodr.* X, 304) pertinet. Habitu paniculaque foliata ad *S. Scorodoniam* accedit, sed ab ea ut etiam a plerisque speciebus sectionis cyma foliata caudiceque perenni præditis valde distincta calycis lacinias ovato-lanceolatis acuminatis margine scariosa destitutis, pedunculis gracilibus filiformibus, capsulis parvulis, etc. (Coss. gall. ling. l. c.)


EXPLICATIO FIGURARUM.


1. *Scrofularia tenuipes*, caulis floriferi et fructiferi pars superior, magn. nat.
2. Caulis fragmentum in parte inferiore plantæ depromptum, magn. nat.
3. Flos a latere visus, magn. auctus.
4. Corolla arte fissa et explanata, a facie interiore visa, magn. aucta.
5. Ovarium, calyce et corolla staminifera avulsis, a latere visum, magn. auctum.
6. Capsula cum calyce persistente, a latere visa, magn. aucta.














TAB. 130.


ILLUSTR. FL. ATL.



Lemercier et C[°] impr.

Ch. Cuisin del.


SEDUM TUBEROSUM Coss. et A. Lx.



Ch. Cuisin del.

Lemercier et Cie Imp.

SEDUM MULTICEPS Coss. et DR.





Picard et Grönland del.

Lemercier et Cie Imp.

HOHENACKERIA POLYODON Coss. et DR.





Fig. 1-11. GAILLONIA REBOUDIANA Coss. et DR.

Fig. 12-13. G. AUCHERI Jaub. et Spach.




Ch. Cuisin del.

Lemercier et Cie Impr.

Fig. 1-8. SCABIOSA FARINOSA Coss.


Fig. 9-10. S. SUCCISA L.




Riocreux del.

Lemercier et Cie Impr.

PERRALDERIA CORONOPIFOLIA Coss.






Ch. Caisin del.

Lemerrier et C^{ie} Impr.

Fig. 1-11. *CENTAUREA CONTRACTA* Viv.

Fig. 12.-15. *C. GLOMERATA* Vahl.




Lemercier et Cie Impr.

Ch. Cuisin del.

CENTAUREA KROUMIRENSIS Coss.











Fig. 1-9. SILEBUM EBURNEUM Coss. et DR.
Fig. 10-11. S. MARIANUM Gaertn.







ONOPORDON ESPINÆ Coss.

Ch. Cuisin del.

Lemercier et Cie Imp.






Rioucroux del.

Monnier et Cie impr.

TOURNEUXIA VARIIFOLIA Coss.









Ch. Cuisin del.

Lemercier et Cie Impr.

Fig. 1-6. ANDRYALA MOGADORENSIS Coss. et Bal.
Fig. 7. A. RAGUSINA L.









INDEX SPECIERUM
IN HOC FASCICULO DELINEATARUM

	Pag.	ab.
<i>LUDOVICIA KREMERIANA</i> Coss.....	43	124
<i>HEDYSARUM NAUDINIANUM</i> Coss. et DR.....	44	125
— <i>PERRAUDERIANUM</i> Coss. et DR.....	46	126
— <i>MEMBRANACEUM</i> Coss. et Bal.....	47	127
<i>ACACIA GUMMIFERA</i> Willd.....	48	128
— <i>TORTILIS</i> Hayne.....	50	129
<i>SEDUM TUBEROSUM</i> Coss. et A. Lx.....	52	130
— <i>MULTICEPS</i> Coss. et DR.....	53	131
<i>HOHENACKERIA BUPLEURIFOLIA</i> Fisch. et Mey.....	55	132
— <i>POLYODON</i> Coss. et DR.....	55	133
<i>GAILLONIA REBOUDIANA</i> Coss. et DR.....	57	134
— <i>AUCHERI</i> Jaub. et Sp.....	57	134
<i>SCABIOSA FARINOSA</i> Coss.....	58	135
— <i>SUCCISA</i> L.....	59	135
<i>PERRALDERIA CORONOPIFOLIA</i> Coss.....	61	136
<i>CENTAUREA TAGANA</i> Brot. var. <i>Africana</i>	63	137
— <i>CONTRACTA</i> Viv.....	64	138
— <i>GLOMERATA</i> Vahl.....	65	138
— <i>KROUMIRENSIS</i> Coss.....	66	139
— <i>FURFURACEA</i> Coss. et DR.....	67	140
— <i>OMPHALODES</i> Coss. et DR.....	69	141
<i>SILYBUM EBURNEUM</i> Coss. et DR.....	70	142
— <i>MARIANUM</i> Gærtn	71	142
<i>ONOPORDON ESPINÆ</i> Coss.....	71	143
<i>TOURNEUXIA VARIIFOLIA</i> Coss.....	73	144
<i>ANDRYALA SPARTOIDES</i> Pомel.....	74	145
— <i>MOGADORENSIS</i> Coss. et Bal.....	76	146
— <i>RAGUSINA</i> L.....	76	146
<i>CYCLAMEN AFRICANUM</i> Boiss. et Reut.....	77	147
— <i>LATIFOLIUM</i> Sibth. et Sm.....	79	148

OUVRAGES DE M. E. COSSON

SUR

LA FLORE DE L'ALGÉRIE, DE LA TUNISIE ET DU MAROC,

ÉDITÉS OU EN VENTE

CHEZ M. G. MASSON,

PARIS, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, N° 120.

Flore d'Algérie, Phanérogamie, Groupe des Glumacées (seu *Descriptio Glumacearum in Algeria nascentium*), en collaboration avec M. Durieu de Maisonneuve, faisant partie de l'*Exploration scientifique de l'Algérie*, publiée par ordre du Gouvernement. — 1 vol. grand in-4° de civ-331 pages. Imprimerie impériale. 1854-1867.

Ce travail sur les Glumacées de l'Algérie est l'œuvre presque exclusive de M. E. Cosson, ainsi que M. Durieu s'est plu à le reconnaître.

Compendium Floræ Atlanticae seu *Expositio methodica plantarum omnium in Algeria neenon in regno Tunetano et imperio Maroccano hucusque notarum, ou Flore des États barbaresques, Algérie, Tunisie et Maroc.*

Le *Compendium Floræ Atlanticae*, dont le programme a été agréé par le Gouvernement après avoir reçu la haute approbation de la plupart des membres de la section botanique de l'Académie des sciences, comprend :

1^e UNE PARTIE HISTORIQUE ET GÉOGRAPHIQUE accompagnée de cartes botaniques.

Le premier fascicule (Historique et Géographie) renferme : une *Notice sur les voyages et les explorations* qui ont le plus contribué à faire connaître la flore de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc;—un *Répertoire alphabétique des principales localités* mentionnées dans le *Compendium Floræ Atlanticae* et des mots arabes ou kabyles entrant le plus fréquemment dans la composition des noms de lieux (rédigé avec le concours de MM. L. Kralik, A. Letourneux, V. Reboud, A. Warion);—une *Note sur la division de l'Algérie en régions naturelles*;—une *Énumération des principales localités explorées en Algérie*, suivies des noms de leurs探索ateurs, etc. — 1 vol. grand in-8° de 265 pages, avec deux cartes botaniques. Imprimerie nationale, 1881.

Cette partie sera complétée par un second fascicule, consacré à la géographie botanique, donnant l'exposé des caractères propres de la végétation et de ses affinités étudiés dans l'ensemble des pays compris dans le domaine de la flore et dans chacun d'eux en particulier. — Les cartes botaniques de la Tunisie et du Maroc accompagneront ce second fascicule.

Les deux cartes botaniques de l'Algérie qui font partie du premier fascicule peuvent être acquises à part, collées sur toile, avec le *Répertoire alphabétique* des principales localités mentionnées dans le *Compendium Floræ Atlanticae*, augmenté de nombreuses indications d'altitudes relevées récemment par MM. les Officiers de l'État-Major et par MM. les Ingénieurs des chemins de fer de l'Algérie et de la Tunisie, dues aux obligeantes communications de M. le colonel Perrier, directeur du service géographique au Dépôt de la Guerre, et à celles des Directeurs des compagnies des divers chemins de fer.

2^e UNE PARTIE DESCRIPTIVE constituant la Flore Atlantique proprement dite, consacrée à la description de toutes les espèces observées jusqu'ici en Algérie, en Tunisie et au Maroc, et donnant pour chacune d'elles : une description mettant en relief ses caractères essentiels;—une synonymie suffisamment étendue, comprenant l'indication des ouvrages dans lesquels la plante a été décrite ou figurée et celle des exsiccata algériens ou autres dans lesquels elle a été publiée;—la distribution géographique de l'espèce dans le domaine de la flore et dans l'ensemble du monde.

Cette partie se composera de plusieurs volumes, en cours d'exécution; le premier a paru en 1887.

Illustrationes Floræ Atlanticae seu *Icones plantarum novarum, rariorum vel minus cognitarum in Algeria neenon in regno Tunetano et imperio Maroccano nascentium.*

Cet Atlas se composera de 175 planches, dessinées par MM. Ch. Cuisin et A. Riocreux; le dernier fascicule (fascicule VII) paraîtra prochainement.

Le Règne végétal en Algérie, Considérations générales sur l'Algérie, sur sa végétation spontanée et ses cultures. Conférence de l'Association scientifique à la Sorbonne, 1879. — Brochure in-8° de 75 pages, 1879.